המועצה המדעית - ועדת הבחינות

בחינת שלב א

2021

בפסיכיאטריה

150 שאלות

בהצלחה

1. בן 45, נשוי ואב ל- 4, הופנה על-ידי רופא משפחה לטיפול פסיכיאטרי בשל אינסומניה קשה, על רקע התפרצויות זעם והתלהמות, בעיקר בעבודה.
עקב עמידותו, מטופל בשילוב של Doxepine, Lamotrigine, Trazodone, Escitalopram.
בסופו של דבר מצבו התייצב לחלוטין, אך החל להתלונן על אצירת שתן וירידה קוגניטיבית.
איזה תכשיר אחראי לכך בסבירות **גבוהה יותר**?

   א. Escitalopram

   ב. Trazodone

   ג. Lamotrigine

   ד. Doxepine

2. איזו מבין התגובות הבאות **הכי מתאימה** לחרדת זרים תקינה אצל ילדים?

   א. ילד בן 8 חודשים, שמתפרץ בבכי רב ונצמד לאימו עם כניסתו של טכנאי מזגנים שהוזמן

   ב. ילד בן 11 חודשים, שמתפרץ בבכי של שעה בכל פעם עם כניסתו למעון

   ג. ילד בן שנה וחצי, שמוכן לישון רק בחדר ההורים ומסרב לישון בחדרו

   ד. ילד בן 11 חודשים, שמסרב לשבת במעגל עם פעוטות אחרים

3. איזו העברה **לא** שייכת למושגים על-פי קוהוט?

   א. Merger

   ב. Alter-Ego

   ג. Twinship

   ד. Erotic

4. מהי ההשפעה של Omega 3?

   א. האטה של זרימת דם מוחי

   ב. העלאת אגרגציה של טסיות בדם

   ג. הורדת לחץ דם

   ד. העלאת רמת שומנים בדם

5. תייר מלאוס, בן 31, מתקבל במחלקה פסיכיאטרית סגורה בשל מצב מאני פסיכוטי חריף, מלווה בשמיעת קול של בודהה וטוען שיביא שלום בכל העולם. מהאנמנזה עולה, שלפני שנתיים אובחן במולדתו כשרוי ב- Amok, אושפז בבית-חולים פסיכיאטרי וטופל בהלופרידול ולורזפם. לדבריו, לקראת שחרורו סיפרו לו שהשתולל, היה אלים מאוד, עשה תנועות חוזרות ומוזרות , לפרקים נעמד במקום בשתיקה, לפרקים בהתלהבות צעק דברים מוזרים ובסופו של דבר שכח את כל חוויותיו. רופאי המחלקה חולקים על אבחנת ה- Amok שניתנה לו בעברו. ממה, קרוב לוודאי, סבל המטופל במהלך אשפוזו הראשון, לדעת רופאי המחלקה?

א. מצב קטטוני-אונוירואידי

ב. תסמונת בתר-חבלתית

ג. דליריום

ד. התחזות

6. איזו תופעת לוואי מהבאות תיגרם בסבירות **הכי פחותה** על-ידי שימוש בקוקאין?

א. CVA

ב. Seizures

ג. Myocardial Infarction

ד. Paralytic Ileus

7. הפרעת אישיות פרנואידית מתאפיינת על-פי DSM5 על-ידי כל הבאים, **פרט ל**:

א. חוסר עניין ביחסי מין בשל חשד לבגידה

ב. חיפוש אחר משמעות סמויה

ג. חשד שמרמים או מנצלים אותו

ד. אי אמון באנשים מתוך חשד שינצלו מידע לרעה

8. איזו משאלה **לא** מתוארת בספרו של קארל מנינגר "אדם נגד עצמו"?

א. להרוג

ב. להיהרג

ג. למות

ד. להיענש

9. במאמר המערכת מאת Wisner, KL, et al.
"The Association Between Antidepressant Exposure and Birth Defects - Are We There Yet?"
שפורסם ב- *JAMA Psychiatry.* 2020;77(12):1215-1216,
מוטלת ביקורת על הסקת מסקנות לגבי טרטוגניות של תכשירים נוגדי דיכאון בנשים הרות במחקרם של Anderson KN, Lind JN, Simeone RM, et al. שפורסם ב- *JAMA Psychiatry.* August 5, 2020,
"Maternal use of specific antidepressant medications during early pregnancy and the risk of selected birth defects".
מהו התכשיר שנטען כ**הכי טרטוגני** ביניהם?

א. Venlafaxine

ב. Sertraline

ג. Paroxetine

ד. Fluoxetine

10. איזו מבין התרופות הבאות הניתנות להפרעת פאניקה, גורמת להיענות **גבוהה יותר** בתחילת הטיפול?

א. Fluoxetine

ב. Paroxetine

ג. Citalopram

ד. Fluvoxamine

11. איזה מהביטויים הקליניים הבאים הכי **פחות** אופייניים בסכיזופרניה עם התחלה בגיל ילדות?

א. דחייה חברתית ובעיות לימודים ברקע

ב. אפקט מושטח ולא תואם

ג. מחשבות שווא מורכבות

ד. הזיות ראיה

12. איזה מבין סימני הדיכאון יימצא בסבירות **גבוהה יותר** אצל המטופל עם הפרעת כאב (Pain Disorder)?

א. ירידה במשקל

ב. נדודי שינה

ג. שינויים בוקר ערב

ד. האטה פסיכומוטורית

13. במהלך פסיכותרפיה מטופל עסוק בקשר עם אימו, אותה מתאר כאישה קשת יום, שבילדותו עבדה סביב השעון על-מנת לפרנסו. המטפל מתמקד בפרשנויות שלו בקושי של המטופל לקבל את המורכבות שבדמותה, ובאשמה המתעוררת בו כשהוא חווה כעס על ההזנחה בילדותו. במהלך הטיפול, המטופל שוקע במצב דיכאוני. איזו תיאוריה מסבירה את דיכאונו **הכי טוב**?

א. Donald Winnicott

ב. Heinz Kohut

ג. Melanie Klein

ד. Sigmund Freud

14. מה **פחות** אופייני לתסמונת קורסקוף (Korsakoff Syndrome)?

א. ירידה ביוזמה

ב. תפקודים ניהוליים פגומים

ג. חוסר אִכפתיות

ד. ירידה במצב רוח

15. בן 25, הגיע לחדר מיון באי-שקט ניכר, עם תלונות על תחושת שריפה במוח מזה כחודש, שלא ניתן להרגיעה. באיזו הפרעה מדובר?

א. Tactile Hallucination

ב. Cenesthetic Hallucination

ג. Body Dysmorphic Experience

ד. Hypnopompic Hallucination

16. פסיכיאטר ילדים ונוער חושד בהתעללות בבן 12 במשפחה ממעמד סוציואקונומי גבוה על-ידי מבוגר במשפחה. מה הגישה הקלינית **המומלצת** לאור זאת?

א. יש לדבר עם כל אחד מבני המשפחה בנפרד, ולהתרשם מאינטראקציה בין הילד לבין כל אחד מבני המשפחה

ב. אין לשאול שאלות ישירות על התעללות, על-מנת לא להפחיד את הילד או להשפיע עליו

ג. לאישור ההתרשמות יספיק בדרך-כלל, מפגש בו ישתתפו כל בני המשפחה יחד

ד. סביר שהפסיכיאטר טעה באבחנתו, כי התעללות בקטינים זניחה בקרב משפחות במעמד סוציואקונומי גבוה

17. מאיזה נוירוטרנסמיטר מסונתז מלטונין?

א. סרוטונין

ב. דופמין

ג. נוראפינפרין

ד. אצטילכולין

18. מבין נוגדי הדיכאון הבאים מהו הספציפי **ביותר** לקולטן נוראדרנרגי?

א. Bupropion

ב. Desipramine

ג. Doxapine

ד. Reboxetine

19. מאמר הסקירה מאת Goodman WK, et al,
"Harmonizing the Neurobiology and Treatment of Obsessive-Compulsive Disorder"
שפורסם ב- American Journal of Psychiatry Jan 2021:17-29,
מדגיש פעילות מוגברת ב- FMRI במטופלים הסובלים מ- OCD.
באיזה מסלול נמצאה פעילות זו?

א. Cortico-Striato-Thalamo-Cortical Loop

ב. Fronto-Mesolimbial-Cortical Loop

ג. Tubero-Infundibular-Cortical Loop

ד. Parieto-Amygdala-Cortical Loop

20. איזה מהביטויים הקליניים **לא** אופייני במרבית המטופלים המתקבלים באפיזודה מאנית?

א. שיפוט פגום

ב. התנהגות פוגענית מאיימת

ג. נוכחות פסיכוזה דלוזיונאלית

ד. מסירת פרטי מידע אמינים

21. בת 60, לראשונה בחייה מתאשפזת במחלקה סגורה בשל התנהגות לא מאורגנת, מלווה באלימות, נראית ונשמעת מבולבלת, לא ענייינית, חזרתית, טוענת שאחת מהמטופלות במחלקה היא בנה ומנסה לגונן עליה, שומעת את קול בנה, שפוקד עליה לעזוב את המחלקה. לא מתמצאת בזמן, במקום ובסיטואציה.
מהאנמנזה עולה, ששינויים במצב רוחה היו גם קודם, אך מעולם לא הגיעו לעוצמות כאלה.
בדיקות דם תקינות, ללא חסך נוירולוגי. לאחר כישלון בנוירולפטיקה, הוסף ליתיום ומצבה השתפר פלאים.
החלה מתמצאת בכל המובנים ומדברת לעניין.
ממה נבע מצבה בסבירות **הגבוהה ביותר**?

א. גידול מוחי לא מזוהה

ב. הפרעה דו-קוטבית עם סימני פסיאודדמנציה

ג. התחזות

ד. אלצהיימר עם סימנים פסיכוטיים

22. איזו הפרעה **לא** שייכת ל- Paraphilic Disorders?

א. Persistent Genital Arousal Disorder

ב. Exhibitionism

ג. Frotteurism

ד. Pedophilia

23. מה הסיבה **השכיחה ביותר** למלפורמציות אצל תינוקות?

א. שימוש לרעה באלכוהול אצל אימהות

ב. מחלות גנטיות

ג. השפעת וירוסים

ד. טראומות במהלך הלידה

24. לאיזו קבוצה שייך Anandamide?

א. Cannabinoids

ב. Opioids

ג. Stimulants

ד. Hallucinogens

25. איזה משלבי ההתפתחות על-פי פרויד תואם שלב של קביעות האובייקט (Object Constancy) לפי Object Relations?

א. אורלי

ב. אנלי

ג. פאלי

ד. לטנטי

26. בן 60, מובא לבדיקה על-ידי אשתו, שמוסרת, כי בשנים האחרונות הוא השתנה ומצבו ממשיך להידרדר. הפך עצבני, מזניח את עצמו, "עושה שטויות" ומדבר גסויות. בבדיקתו מתגלים: רעד, אניזוקוריה, החזרים מוגברים, דיבור לא ברור, ירידה בזיכרון ומחשבות שווא של גדלות.
מה **יותר סביר** שנמצא בעברו?

א. עגבת לא מטופלת

ב. הרפס בשפתיים

ג. חצבת בילדות

ד. אכילת מוח של פרה

27. מעשיהן של בעלות הפרעת אישיות גבולית בעִתות משבר מתאפיינים על-ידי כל הבאים, **פרט ל**:

א. בלתי צפויים

ב. מתבטאים ב- Acting Out

ג. נצלניים

ד. מתבטאים בפגיעה עצמית

28. איזה מהתכשירים נוגדי פסיכוזה הבאים סונתז ראשון?

א. Clozapine

ב. Risperidone

ג. Olanzapine

ד. Aripiprazole

29. בת 13, הגיעה בליווי הוריה למיון, לאחר התפרצות זעם. ההורים מספרים כי מדובר בילדה עם התפתחות תקינה, תלמידה מצוינת ופרפקציוניסטית, חברותית, ללא קשיים התנהגותיים.
בשלושת החודשים האחרונים היא נראית מוטרדת, מרבה לשאול את ההורים שאלות באופן חזרתי, על-מנת לקבל אישור כמעט לכל פעולה, רק אז נרגעת לפרקי זמן קצרים. התנהגות זו חוזרת על עצמה ואף מתגברת לקראת הערב. ניסיון של ההורים להתעלם מהנערה ולא להגיב לה, גרם להתפרצות קשה.
מה האבחנה **המתאימה ביותר**?

א. הפרעה טורדנית-כפייתית

ב. חרדת פרידה

ג. חרדה מוכללת

ד. תסמונת טורט עם טיק מורכב

30. מה **לא** כלול ב- Borderline Personality Organization?

א. חוסר בתחושת זהות מגובשת

ב. חולשת אגו

ג. שימוש במנגנוני הגנה פרימיטיביים

ד. סופר-אגו אינטגרטיבי

31. Mini–Mental State Examination (MMSE) בודק את כל התפקידים הבאים, **פרט ל**:

א. התמצאות

ב. שיפוט

ג. קשב

ד. שפה

32. מה הסימן שמבדיל בין Lethal Catatonia לשאר הסוגים?

א. Fever

ב. Catalepsy

ג. Cataplexy

ד. Perplexity

33. קיום של איזה מהבאים מהווה את ההבדל המהותי בין הפרעה דו-קוטבית מסוג 2 לבין ציקלוטימיה?

א. מאניה

ב. שינוי במצב רוח

ג. היפומאניה

ד. דיכאון מז'ורי

34. בת 30, אם לשניים מגיעה הביתה, לאחר שננזפה קשות על-ידי המנהלת במקום עבודתה. היא רגזנית, כעוסה ומתחילה לצעוק על הילדים הקטנים, בלי להבין למה היא כועסת. איך נקרא מנגנון ההגנה בו משתמשת?

א. התקה

ב. השלכה

ג. רציונליזציה

ד. הכחשה

35. מה הסיבה **השכיחה ביותר** להופעת הזיות במהלך אשפוז בבית-חולים כללי?

א. Brief Psychotic Disorder

ב. Schizophrenia

ג. Delirium Tremens

ד. Major Neurocognitive Disorder

36. איזו מבין הדמנציות הבאות ניתנת לריפוי?

א. Normal Pressure Hydrocephalus

ב. Pic's

ג. Alzheimer's

ד. Binswanger's

37. איזו מתופעות הלוואי הבאות **לא** אופיינית לליתיום?

א. פולידיפסיה משנית

ב. שינויים בגל T באק"ג

ג. התפרצות של נגעי עור פוליקולריים

ד. רעד איטי במנוחה

38. בת 35, עברה לאחרונה דירה והחליפה קופת-חולים. מאז המעבר פונה לרופא משפחה כמעט מידי יום עם תלונות על חולשה קיצונית, הקאות וסחרחורות. לעיתים שוכבת על הרצפה עד שמזעיקים מישהו מבני המשפחה. בדיקת נוירולוג, EEG, בדיקות דם והדמית ראש תקינים. דורשת לעבור גסטרוסקופיה וקולונוסקופיה. לדבריה, אימה נפטרה מסרטן קיבה. בבדיקת הגיליון הרפואי עברה גסטרוסקופיה וקולונוסקופיה לפני חצי שנה. מה תהיה האבחנה **הסבירה ביותר**?

א. Adjustment Disorder

ב. Borderline Personality Disorder

ג. Factitious Disorder

ד. Anxiety Disorder, Unspecified

39. מה הסימפטום ש**לא** משותף ל- ADHD ו- Bipolar Disorder בגיל ילדות?

א. פטפטנות

ב. הסחת דעת

ג. היפראקטיביות

ד. צורך מועט בשינה

40. איזו תכונת אופי נעלמת במהלך היכרות ממושכת יותר אצל בעלי הפרעת אישיות דיסוציאלית?

א. שרמנטיות

ב. מניפולטיביות

ג. שקרנות

ד. רגזנות

41. למה דומה באופן עקרוני שיטת האבחון של דיכאון מז'ורי על-פי DSM?

א. היסטריה על-פי פרויד

ב. סכרת על-פי בדיקת רמת סוכר חוזרת

ג. התקף לב על-פי ECG

ד. פיברומיאלגיה על-פי אוסף סימנים ותסמינים

42. בן 50, מאושפז בבית-חולים כללי, מפתח מצב בלבולי על רקע אלכוהוליזם כרוני.
מה מהסימנים הבאים ימצא בסבירות **הפחותה** בבדיקתו?

א. שיתוק פציאלי

ב. Gate Ataxia

ג. ניסטגמוס הוריזונטלי

ד. הפרעות וסטיבולריות

43. שופט מפנה עצור להסתכלות פסיכיאטרית טרם הגשת כתב אישום בעניינו.
איזה מידע מצפה השופט לקבל מהפסיכיאטר הבודק לגבי העצור?

א. כשירותו למעצר

ב. הטיפול שהוא מקבל

ג. אחריות למעשיו בזמן ביצוע העבירה

ד. כשירותו לעמוד לדין

44. מי כתב את הספר "Beyond the Pleasure Principle"?

א. Sigmond Freud

ב. Melanie Klein

ג. Margaret Mahler

ד. Erik Erikson

45. בן 40, אלכוהוליסט, שנים לוקה בהפרעה דו-קוטבית. בריא, למעט עליה חדה בטרנסאמינזות.
איזה מהתכשירים הבאים יומלץ עבורו?

א. Lithium

ב. Valproic Acid

ג. Carbamazepine

ד. Chlorpromazine

46. מה ההשפעה הפריפרית של קנבינואידים?

א. החמרת גלאוקומה

ב. הפחתת זרימת דם כלייתית

ג. ויסות לחץ הדם

ד. סיכון יתר להיריון חוץ רחמי

47. בבדיקת דם לרמת Lithium התקבלה תוצאה 0.4, למרות שבבדיקות הקודמות התקבלו תוצאות 0.7-0.8,
ולא נעשה שינוי במינון של ה- Lithium.
מה יכולה להיות הסיבה לכך?

א. הוספת Hypothiazide

ב. הריון

ג. מעבר ללקיחת התרופה במנה אחת בערב

ד. לקיחת התרופה כשמונה שעות לפני הבדיקה

48. כל הבאים הם מאפיינים קליניים של Rett Syndrome,
פרט ל:

א. תנועות סטריאוטיפיות בידיים

ב. ספסטיות

ג. אטקסיה

ד. דיבור רב עם נטייה להפשטת יתר

49. בן 38, סובל מהפרעה דיכאונית-חרדתית, מלווה בהתפרצויות זעם ועקב עמידותו לטיפול נוטל שילוב של Venlafaxine, Sertraline, Lamotrigine ו- Amitriptyline.
מתלונן על ירידה בחשק המיני ועיכוב שפיכה.
איזה תכשיר בסבירות **פחותה** יותר יכול לגרום לכך?

א. Lamotrigine

ב. Sertraline

ג. Venlafaxine

ד. Amitriptyline

50. מהו הסימפטום הגופני אשר מאפיין יותר פוביה חברתית לעומת התקף פאניקה?

א. קוצר נשימה

ב. הסמקה

ג. מחנק

ד. סחרחורת

51. על מה נסמך הסיווג של Bulimia Nervosa מקל עד כבד (Mild to Extreme)?

א. מספר האפיזודות של ההתנהגויות המפצות בשבוע

ב. סוג ההתנהגות המפצה

ג. השפעת ההתנהגות המפצה על המשקל

ד. השלב בו החלה ההתנהגות המפצה

52. איזו מההפרעות הבאות מופיעה בשכיחות **הנמוכה** ביותר עם Hording Disorder?

א. Schizophrenia

ב. Compulsive Buying

ג. ADHD

ד. Manic Episode

53. בן 26, בפגישת האינטייק במרפאה, מצהיר בתחילת דבריו:
"קיבלתי המלצות עליך, כי אני תמיד בוחר מטפל הכי טוב".
איזו הפרעת אישיות **תואמת יותר** את האמירה הזו?

א. אובססיבית-קומפולסיבית

ב. הימנעותית

ג. נרקיסיסטית

ד. פרנואידית

54. איזה נוגד פסיכוזה מהבאים יגרום בסבירות **הגבוהה ביותר** להארכת QTC?

א. Sertindole

ב. Olanzapine

ג. Risperidone

ד. Quetiapine

55. איזה מהסימפטומים הבאים **לא** מאפיין אנצפלופתיה כבדית?

א. אסטריקסיס

ב. ערנות יתר

ג. שינויים באישיות

ד. ירידה בזיכרון

56. באיזה אזור מתרחשת הפגיעה העיקרית ב- Alzheimer's Disease?

א. פריאטו-טמפורלי

ב. פרונטו-טמפורלי

ג. טמפורו-אוקסיפיטלי

ד. טלמו-אוקסיפיטלי

57. בן 12, מובא למיון על-ידי הוריו עקב טיקים מוטוריים רבים (תנועות צוואר, מצמוצים בעיניים) וכחכוח בגרון, אשר נמשכים קרוב לשנה עם תקופות של הטבה והחמרה.
איזה מהבאים הכי **פחות** יתמוך באבחנה של תסמונת טורט (Tourette's Disorder)?

א. התחלת הטיקים בגיל 7

ב. שילוב של טיקים מוטורים וקוליים

ג. סימנים פסיכוטיים בבדיקה

ד. הפרעת ADHD נלווית

58. מהו טיפול הבחירה בהרעלת הלוצינוגנים?

א. Haloperidol

ב. Diazepam

ג. Lamotrigine

ד. Quetiapine

59. בן 32, בריא גופנית, מתקבל למחלקה סגורה במאניה אקוטית. שוקל 70 ק"ג.
הוחלט על מתן טיפול ב- Valproic Acid.
מה המינון המומלץ ביום הראשון של הטיפול במטופל זה?

א. 200 מ"ג

ב. 400 מ"ג

ג. 600 מ"ג

ד. 1000 מ"ג

60. איזו מהפרעות האישיות **לא** מופיעה ב- DSM 5?

א. פסיבית-אגרסיבית

ב. מאנית

ג. דיכאונית

ד. סדיסטית

61. מה ההתייחסות המקובלת להעברה ליבידינלית בטיפול פסיכואנליטי?

א. מחייבת הפסקת טיפול

ב. משרתת את הטיפול במקרים קלים

ג. דורשת התערבות מיידית ופירוש מצד המטפל

ד. מהווה ניגוד להעברה אירוטית

62. בת 40, הלוקה בהפרעה סכיזואפקטיבית ממושכת ועמידה לטיפול, התקבלה למחלקה במצב מאני פסיכוטי קשה, שלא הגיב למגוון מייצבי מצב רוח ונוגדי פסיכוזה בשילובים שונים. בעברה הייתה מאוזנת עם Clozapine, שהופסק במרפאה בשל לויקופניה ונויתרופניה. לאחר קונסיליום הוחלט להחזיר לה בהדרגה טיפול ב- Clozapine תחת כיסוי תכשיר נוסף, שעשוי לשמור עליה בפני אגרנולוציטוזיס.
איזה מהתכשירים הבאים יכול לשמש למטרה זו?

א. Lithium

ב. Haloperidol

ג. Propranolol

ד. Lorazepam

63. באיזו הפרעה **לא** נצפה קיצור REM Latency?

א. Major Depressive Disorder

ב. Schizophrenia

ג. Dysthymic Disorder

ד. Obsessive-Compulsive Personality Disorder

64. מה הפתרון המעשי ביותר כטיפול בריור יתר לילי הנובע משימוש ב- Clozapine, כאשר **לא** ניתן להחליף את התרופה?

א. שימת מגבת על הכרית

ב. מתן Biperiden

ג. מתן Clonidine

ד. מתן Amitriptyline

65. בת 15, לומדת בבית-ספר רגיל בכיתה מקדמת. בבית-הספר לאורך השנים, מתוארת כתלמידה טובה, אך עם קשיי ריכוז וקשיי התארגנות. מבחינה חברתית מתבודדת ואין לה חברים. בזמנים של שינוי מהשִגרה, כמו שיעור שבוטל, היא בוכה ומתפרצת. בשעות הפנאי אוהבת לקרוא על אסטרונומיה ויש לה ידע רחב בתחום זה באופן חריג.
בבדיקה פסיכיאטרית, הבעת הפנים ללא גיוון אפקטיבי, דיבור מונוטוני, לא יוצרת קשר עין, עונה לעניין במשפטים קצרים. אימה מספרת שכילדה קטנה נהגה "לנפנף בידיה מרוב התרגשות".
מהי האבחנה **המתאימה ביותר** עבורה?

א. הפרעת אישיות פרנואידית

ב. הפרעה ברצף האוטיסטי

ג. סכיזופרניה של הילדות

ד. הפרעת קשב וריכוז עם היפראקטיביות ואימפולסיביות

66. איזו מהתופעות הבאות תתגלה **בסבירות גבוהה** יותר אצל אדם עיוור על רקע קטרקט?

א. שמיעת שירים דתיים

ב. הרגשת ריח שריפה

ג. תחושת חרקים זוחלים על הרגליים

ד. ראיית מתים

67. בן 60, לוקה בהפרעה סכיזואפקטיבית שנים רבות. נוטל שילוב של מספר תרופות ומאוזן איתן, למעט עצירות קשה.
איזה מהתכשירים שנוטל, גורם לעצירות **בסבירות הגבוהה** ביותר?

א. Haloperidol Decanoate

ב. Biperiden

ג. Valproic Acid

ד. Lorazepam

68. במה מתבטא ההבדל **המשמעותי ביותר** בין Factitious Disorder לבין Malingering?

א. התנהגות

ב. חשיבה

ג. רגש

ד. רווח

69. בתום הסגר השני של הקורונה, פונה גבר בן 45 בתלונות על מצוקה נפשית, מצב רוח ירוד ותופעות חרדה, שלא יצליח להחזיק את המסעדה שפתח ושלא יעמוד בתשלומי המשכנתא.
כמו-כן, מדווח על חיכוכים עם אשתו על רקע חוסר הסכמה בגישה כלפי ילדיו בזמן הסגרים והבידודים.
באיזה שלב לפי אריקסון נמצא הגבר?

א. Identity vs. Role Confusion

ב. Intimacy vs. Isolation

ג. Generativity vs. Stagnation

ד. Integrity vs. Despair

70. מי מהבאים קבע, שמטרת המראיין היא לעורר במטופל מידה של חרדה, שמצד אחד תוביל להצפת מנגנוני ההגנה העיקריים שלו, ומצד שני תאפשר לו להישאר בחדר ולהמשיך בפגישה?

א. Otto Kernberg

ב. Donald Winnicott

ג. Heinz Kohut

ד. Franz Alexander

71. מיהו הגוף הראשי להחליט על השחרור מצו אשפוז?

א. מנהל בית-חולים

ב. פסיכיאטר מחוזי

ג. וועדה פסיכיאטרית מחוזית

ד. בית משפט מחוזי

72. בת 40, לאחר היסטרקטומיה, מתקבלת במאניה רוגזת למחלקה סגורה.
מה הטיפול **המועדף** במצבה?

א. Lamotrigine

ב. Lithium

ג. Carbamazepine

ד. Valproic Acid

73. לפי הנחיות הטיפול ב- Clozapine עד לאיזה מינון יש לעלות ולהמתין לתגובה קלינית בגבר שאינו מעשן?

א. 150 מ"ג

ב. 300 מ"ג

ג. 450 מ"ג

ד. 600 מ"ג

74. בת 35, מאושפזת בבית-חולים פסיכיאטרי בשל מצב פסיכוטי, עמיד לטיפול תרופתי, על רקע סכיזופרניה, בגינה נוטלת 500 מ"ג קלוזפין. המטופלת, בצורה פתאומית, חשה כאבי בטן, בחילה ומתחילה להקיא בקשת. מה הגישה הטיפולית **המיידית הנכונה** שיש לנקוט במקרה זה?

א. לתת פרמין

ב. לעשות חוקן

ג. לתת לוריבן

ד. לפנות לבית-חולים כללי

75. איזה סימן מאפיין הרעלת סטימולנטים?

א. שינויים בלחץ דם

ב. מיוזיס

ג. עליה במשקל

ד. התחזקות שרירים

76. כל הבאים הם טיפולים יעילים ב- Enuresis,
פרט ל:

א. Desmopressin בספריי לאף

ב. טיפול התנהגותי

ג. Reboxetine

ד. Mirtazapine

77. איך נקרא המצב בו דליריום מופיע בחולה דמנטי?

א. Praecox Dementia

ב. Beclouded Dementia

ג. Delirantum Dementia

ד. Ribo Dementia

78. בת 25, שקטה, לא יוצאת לבילויים, מתגוררת עם אימה המרותקת למיטה.
איזו הפרעת אישיות **פחות סבירה** כאבחנה מבדלת במקרה שלה?

א. תלותית

ב. סכיזואידית

ג. הימנעותית

ד. גבולית

79. בן 22, מגיע לחדר מיון עם התקף חרדה, לאחר שנטל סמים במסיבה.
באיזה סם **פחות** סביר שהשתמש?

א. LSD

ב. MDMA

ג. Codeine

ד. Cocaine

80. במה מלווה Pseudocyesis?

א. Amenorrhea

ב. Dyspareunia

ג. Pica

ד. Vaginismus

81. בן 40, מכור לאלכוהול, גוסס מ- Hepatic Cirrhosis,
אומר לבנו: "הייתי מת בכל מקרה, לפחות נהניתי מהשתייה".
באיזה מנגנון הגנה הוא משתמש?

א. רציונליזציה

ב. השלכה

ג. הומור

ד. פיצול

82. מהו מנגנון הפעולה האנטי-דיכאוני של Mirtazapine?

א. Postsynaptic 5-HT_2 agonism

ב. Postsynaptic 5-HT_3 agonism

ג. Presynaptic α_2 antagomism

ד. HT1 agonism

83. בת 25, לאחר טיפול ב- Haloperidol, מגיעה להתייעצות בשל הפסקת וסת והפרשת חלב. (β HCG - שלילי).
מה התכשיר **המומלץ** כטיפול המשך?

א. Quetiapine

ב. Paliperidone

ג. Amisulpride

ד. Risperidone

84. בן 30, הלוקה בסכיזופרניה מגיל 17, לא מטופל בנוירולפטיקה ויחסית מאוזן, אך מדווח על חוסר יכולת ליהנות ממשהו שעמיתיו לעבודה השיקומית כן נהנים.
הפחתה באיזה נוירוטרנסמיטר אחראית לכך בסבירות **גבוהה יותר**?

א. Glutamate

ב. Acetylcholine

ג. GABA

ד. Norepinephrine

85. עולה חדש מספר שהוא מאוד מתחבר לתרבות הישראלית ולהיסטוריה, מזדהה עם מנהגי היהדות ופחות משתתף במנהגי התרבות של ארץ מולדתו.
באיזה תהליך קליטה מדובר?

א. Ascetism

ב. Integration

ג. Assimilation

ד. Marginalization

86. מה בין התכשירים הבאים **הפחות** יעיל ב- Tourette Disorder?

א. Clozapine

ב. Haloperidol

ג. Aripiprazole

ד. Risperidone

87. בת 40, הלוקה באפילפסיה לא מאוזנת, הפרעת חרדה והפרעה סכיזואפקטיבית.
איזה מהתכשירים הבאים **פחות** מסוכן עבורה מבחינת הפרכוס?

א. Bupropion

ב. Clozapine

ג. Trihexyphenidyl

ד. Buspirone

88. מה בודק מבחן ציור שעון?

א. תובנה ושיפוט

ב. תכנון וארגון

ג. מסוכנות אובדנית

ד. הליך ותוכן חשיבה

89. באיזו מהאבחנות הבאות מספיקה בדיקת מצב נוכחי, ללא צורך במהלך ממושך יותר?

א. Conversion Disorder

ב. Panic Disorder

ג. Obsessive Compulsive Disorder

ד. Anorexia Nervosa

90. מטופל מתבקש בפגישת היכרות עם המטפל לתאר את עצמו. המטופל נותן פרטים המתייחסים לגילו והשכלתו, אך מתקשה בכל תיאור מעמיק יותר המתייחס לעצמו.
באיזו בעיה מדובר על-פי קרנברג?

א. הפרעה ב- Body Image

ב. Identity Diffusion

ג. שימוש במנגנון של Split

ד. חוסר ב- Superego Integration

91. באיזו מההפרעות הבאות הטיפול ב- ECT **פחות** יעיל?

א. Obsessive-Compulsive Disorder

ב. Acute Delirium

ג. Chronic Schizophrenia

ד. Neuroleptic Malignant Syndrome

92. איזה מהקולטנים הבאים נחסם על-ידי Caffeine?

א. GABA

ב. Adenosine

ג. NMDA

ד. Acetylcholine

93. בן 15, עם ADHD, הגיב בתופעות לוואי לתכשירים שונים. כשהרופא המטפל מציע שימוש ב- Modafinil בהתבסס על מחקרים, מנהל המחלקה לא מסכים בנימוק, שבזמנו ה- FDA פסל אותו לשימוש ב- ADHD.
מה הייתה הסיבה לפסילתו?

א. נדודי שינה

ב. Steven-Jonson Syndrome

ג. כאבי ראש

ד. Agranulocytosis

94. באיזו הפרעת אישיות "חוסר יציבות" מהווה קריטריון עיקרי?

א. גבולית

ב. היסטריונית

ג. נרקיסיסטית

ד. אנטיסוציאלית

95. בת 25, ממשפחה אמידה, מגיעה במכונית לקסוס לחנות מותגים, גונבת שמלת ערב ונתפסת על-ידי המאבטח.
עורך דינה טוען לאי שפיותה בשל היותה קלפטומנית.
מה המסקנה המתבקשת לגבי מקרה זה בכתיבת חוות דעת?

א. סובלת מקלפטומניה, לא אחראית למעשיה ולא יכולה לעמוד לדין

ב. לא סובלת מקלפטומניה, אחראית למעשיה ויכולה לעמוד לדין

ג. סובלת מקלפטומניה, אך יכולה לעמוד לדין

ד. סובלת מקלפטומניה, מידת אחריותה מוגבלת

96. כל הבאים מהווים קריטריונים ל- Binge Eating Disorder על-פי DSM5,
פרט ל:

א. אכילת כמות האוכל שבהחלט עולה על כמות האוכל של רוב האנשים בפרק זמן דומה

ב. אכילת כמויות מזון ללא תחושת רעב

ג. תחושת הנאה ושובע אחרי הבולמוס

ד. אכילה הרבה יותר מהירה מהנורמה

97. מהי ההפרעה הנפשית הנלווית **הנפוצה ביותר** להפרעת OCD?

א. הפרעת חרדה חברתית

ב. טורט

ג. סכיזופרניה

ד. דיכאון מז'ורי

98. כל הבאים שייכים לגרעינים הבזאליים,
פרט ל:

א. Substantia Nigra

ב. Amygdala

ג. Pallidum

ד. Striatum

99. בת 35, אובחנה כלוקה בדיכאון עמיד, מטופלת ב- Cipralex 20 מ"ג ליום.
הפסיכיאטר המטפל שלה מחליט לבצע אוגמנטציה.
מה התכשיר **המועדף** לצורך זה?

א. Asenapine

ב. Sertindole

ג. Aripiprazole

ד. Iloperidone

100. מה מאפיין ריכוז של מטבולית סרוטונין 5HAA באנשים אובדניים?

א. נמוך בנוזל חוט שידרה

ב. גבוה בנוזל חוט שידרה

ג. נמוך בדם

ד. גבוה בדם

101. בן 4, בעל מוגבלות שכלית התפתחותית מלווה בהתנהגויות כפייתיות, אכילת יתר בלתי נשלטת, נטייה לישנוניות בשעות היום וחוסר יציבות רגשית. בבדיקה גופנית - היפוטוניה, ידים קצרות, אשכים קטנים ועקמת. הסינדרום בו לוקה מתאפיין בפגיעה באיזה כרומוזום?

א. 15

ב. 6

ג. 8

ד. X

102. מה **לא** מהווה התוויה לטיפול ב- Mirtazapine?

א. נדודי שינה

ב. דיכאון

ג. תופעות לוואי גסטרואינטסטינליות כתוצאה מכימותרפיה

ד. עליה במשקל

103. מהי משמעות המונח "התייעצות טלפונית" בגישת DBT?

א. החלפת מפגשים לטלפונים בתקופת הקורונה

ב. אפשרות לשיחה קצרה מהמטופל למטפל סביב השעון

ג. סוג של קבוצת בלינט

ד. שיחה חד-שבועית מהמטפל למטופל כתוספת לטיפול פרטני

104. איזה סימן מהבאים **חשוב יותר** באבחנה מבדלת בין דליריום לדמנציה?

א. תנודתיות בסימפטומים

ב. הפרעה בקשב

ג. תשובות לא לעניין

ד. חוסר התמצאות

105. בן 45, סובל מסכיזופרניה ממושכת ומטופל באולנזפין, מעשן 2 חפיסות סיגריות ביום.
הפסיכיאטר המטפל מנסה לשכנע אותו להפסיק לעשן.
מה הטיעון **הנכון** להשתמש בו לצורך הפסקת העישון במקרה זה?

א. מוריד משמעותית רמת אולנזפין בדם

ב. מחמיר EPS

ג. פוגע בתפקודים קוגניטיביים

ד. מגביר סיכון ל- Rheumatoid Arthritis

106. איזה סימן מהבאים **לא** תומך ב- Malingered Dissociative Disorder?

א. הגזמה

ב. שקר

ג. סירוב לאנמנזה קולטרלית

ד. בושה

107. אצל מטופל עם שימוש לרעה בחומרים, מתקבלת תוצאת EEG שמדגימה ירידה בפעילות.
באיזה חומר מדובר?

א. מריחואנה

ב. קוקאין

ג. מורפין

ד. ניקוטין

108. בת 32, אושפזה בשל אירועים של התנהגות מוזרה, אי שקט פסיכומוטורי, התפרצויות אלימות ושִכחה לאחר מכן.
איזה מהבדיקות הבאות תאפשר בצורה **הטובה ביותר** להבדיל בין גורם נוירולוגי לגורם נפשי של מצבה?

א. MRI של המוח

ב. מבחן בנדר

ג. מבחן SIMS

ד. וידאו EEG

109. בן 17, עצור בגין אלימות, ברקע עבירות רכוש וסחר בסמים. לא טופל בעבר על-ידי פסיכיאטר/פסיכולוג.
כשנשאל: כמה זה 2+2, עונה: 5. לשאלה: כמה רגלים יש לחתול, עונה: 3. כשמראים לו תמונה של מטוס, עונה: זו ציפור.
מה האבחנה **הסבירה ביותר**?

א. Acute Psychotic State

ב. Ganser's Syndrome

ג. Intellectual Disability

ד. Autistic Spectrum Disorder

110. באיזה סוג של הפרעות חרדה Propranolol **יעיל יותר**?

א. חרדת ביצוע

ב. אגורפוביה

ג. פאניקה

ד. חרדת נטישה

111. מה **נכון** לגבי אינטראקציות תרופתיות של Valproate?

א. מתן יחד עם Carbamazepine, מעלה את ריכוז ה- Valproate בסרום

ב. מתן יחד עם Clozapine, מפחית סדציה

ג. מתן יחד עם Fluoxetine, עשוי להעלות ריכוז Valproate בסרום

ד. מתן יחד עם תכשירים נוגדי פסיכוזה, מפחית תופעות אקסטרפירמידליות

112. מהו מנגנון בסיסי בתאוריה של העברה קלאסית?

א. דיסוציאציה

ב. התקה

ג. אינהיביציה

ד. רציונליזציה

113. איזו תופעה מאפיינת גמילה מאופיאטים?

א. אישונים צרים

ב. שלשולים

ג. ישנוניות

ד. יובש באף

114. מה מאפיין בעלי הפרעת אישיות כפייתית-טורדנית?

א. יוצרים בקלות יחסים בין-אישיים, אך לא שומרים על קשרים קבועים

ב. קפדניים מאוד בענייני עבודה, ולכן מסיימים משימות הרבה לפני כולם

ג. חוששים מטעויות ומגלים חוסר החלטיות בקבלת החלטות שלא מוגדרות או מוכתבות

ד. רציונאליים מאוד, ולכן נפטרים בקלות מדברים חסרי ערך

115. איזה שאלון עצמי מאבחן דיכאון?

א. Beck

ב. Hamilton

ג. Leibowitz

ד. Wechsler

116. איזו הפרעה גופנית מופיעה בשיעור **גבוה יותר** בנשים לסביות?

א. Hypothyroidism

ב. Hyperadrenocorticalism

ג. Hyperparathyroidism

ד. Hypoparathyroidism

117. איזה מבין נוגדי הדיכאון הבאים **יועיל יותר** לחולה בן 40 הלוקה בדיכאון והפרעה כפייתית-טורדנית?

א. Clomipramine

ב. Milnacipran

ג. Desipramine

ד. Mirtazapine

118. מטופלת בת 40, הלוקה בהפרעה סכיזואפקטיבית ונטייה ל- EPS, מתקבלת למחלקה פתוחה.
איזה מהתכשירים הבאים **מועדף** עבורה?

א. Periciazine

ב. Quetiapine

ג. Chlorpromazine

ד. Risperidone

119. מה הסיבה **השכיחה ביותר** לאובדנות בקרב אוכלוסיית הקשישים לעומת אובדנות בצעירים?

א. חוסר תעסוקה

ב. בעיות כלכליות

ג. קשיים ביחסים במשפחה

ד. מחלות גופניות

120. הוריו של ילד מבקשים ממנו לשחק בשקט, כי הרעש שהוא עושה מפריע לאחיו הבכור ללמוד.
הוא ממשיך בשלו, כי לא מסוגל להבין מה לא בסדר.
באיזה שלב התפתחותי לפי ז'אן פיאז'ה נמצא הילד?

א. סנסורי-מוטורי

ב. קדם אופרציונלי

ג. אופרציות קונקרטיות

ד. אופרציות פורמליות

121. על איזה עיוות קוגניטיבי מעידה ההתבטאות:
"רק אם אני מקבל ציון 100, אז אני מצליח, כל ציון אחר משמעותו כישלון"?

א. השלכה

ב. הכול או כלום

ג. חשיבה מאגית

ד. אחריות יתר

122. איזה מהבאים משקף התפתחות מותאמת לגיל?

א. בן 5 מסוגל ליהנות מבדיחות

ב. בת 5 מסוגלת לקרוא ספרים פשוטים להנאתה

ג. בן 4 מסוגל להשתמש עד 300 מילים

ד. בן 5 מסוגל לדבר על רגשות

123. בן 51, הסובל מסכיזופרניה ועודף משקל כבד, מתקבל בהחרפה פסיכוטית מתונה.
משתף פעולה באופן מלא בנטילת הטיפול.
איזה מהתכשירים הבאים **מועדף** עבורו?

א. Quetiapine

ב. Ziprasidone

ג. Risperidone

ד. Olanzapine

124. איזו תכונה מאפיינת את ADHD?

א. נמנעים משעורי בית

ב. קשובים לבן שיח

ג. עובדים לפי הדרכה

ד. שומרים על כלי עבודה

125. איזו הפרעה מהבאות **לא** שייכת ל- NREM?

א. Nightmare

ב. Sleepwalking

ג. Sleep-Related Eating

ד. Sexomnia

126. באיזה מהבאים טיפול ב- Valproic Acid **עדיף** על טיפול ב- Lithium?

א. בת 30, ללא אמצעי מניעה

ב. בן 25, אובדני

ג. בן 35, עם 4 התקפי מאניה בשנה

ד. בת 65, עם הפטיטיס

127. זיכרון למה מהבאים נחשב לזיכרון דקלרטיבי (Declarative Memory)?

א. אירועים

ב. כישורים

ג. הרגלים

ד. למידה לא אסוציאטיבית

128. איזה מערכת נוירוטרנסמיטורית **פחות** מעורבת בהתמכרויות?

א. Opioid

ב. Dopamine

ג. Serotonin

ד. GABA

129. במהלך הריאיון המטופל אומר: "היה לי כל-כך קשה להיפתח בפני מישהו".
המטפל משיב: "אני מבין שהיה לך קשה מאוד להיפתח בפני מישהו".
באיזו טכניקה משתמש המטפל?

א. חיזוק

ב. שיקוף

ג. סיכום

ד. חינוך

130. בן 9, הגיע יחד עם אימו לרופא ילדים, עם תלונות על סירוב לישון בחדרו, דרישה להירדם במיטת ההורים, דאגות שמשהו רע יקרה לאימו וכאבי בטן, בגללם לעיתים לא הולך לבית-הספר.
כל הסימפטומים התחילו לפני כחודש.
מה האבחנה **המתאימה ביותר**?

א. חרדת פרידה

ב. חרדה מוכללת

ג. חרדה תקינה התואמת את הגיל

ד. חרדה היפוכונדריאלית

131. סטודנט מגיע הביתה לאחר כישלון במבחן ואומר לחברו "דפקו אותנו".
באיזה מנגנון הגנה מדובר?

א. הכחשה

ב. השלכה

ג. הזדהות השלכתית

ד. התקה

132. איזה מהתיאורים הקליניים הבאים, בוודאות **לא** ניתן לאבחן בשלב זה כהפרעת אישיות?

א. בת 17, עם נטייה לאימפולסיביות, יחסים בלתי יציבים, וחיתוכי ורידים

ב. בן 17, עם נטייה לחשדנות, תחושה קבועה שנעשה לו עוול, ואינו סומך על הסובבים

ג. בת 17, עם נטייה להחצנת הרגש, צורך בתשומת לב, וסיפורים ארוכים "דרמטיים"

ד. בן 17, עם תיקים במשטרה, נטייה לאלימות, וקושי לקבל מוסכמות חברתיות

133. בן 17, לפני כשלושה שבועות, בדרך לבית-הספר בשדרות, חווה נפילת קסאם בקרבת מקום.
ממשיך ללכת לבית-הספר, אך מרגיש פרפרים בבטן, כשמתקרב למקום האירוע ומרבה להתכתב בפייסבוק עם חבריו על מה שעבר עליו
מה אבחנתו?

א. Acute Stress Disorder

ב. PTSD

ג. Normal Anxiety

ד. Adjustment Disorder

134. לאיזו הפרעה מהבאות תגרום Nightmare Disorder בסבירות **גבוהה יותר**?

א. אינונות

ב. הרטבת לילה

ג. אכילת יתר

ד. פחד משינה

135. הפסקה של איזה מבין ה- SSRI's הבאים תגרום לתסמונת גמילה **קשה יותר**?

א. Fluoxetine

ב. Paroxetine

ג. Citalopram

ד. Escitalopram

136. איזה מהקריטריונים הבאים מאפיין מטופלים הסובלים מדיכאון מז'ורי **ואינו** מאפיין PTSD?

א. הפרעות בריכוז

ב. מחשבות אשמה

ג. אובדן עניין בפעילויות

ד. מחשבות אובדניות

137. בן 16, חברותי, תלמיד מצטיין, בעל אופי נוח, פונה לראשונה בחייו ליעוץ פסיכיאטרי ומספר כי מזה כשנתיים עסוק במחשבות בלתי פוסקות על פחד ש"יתקוף אנשים ברחוב". מעולם לא פגע באדם. מספר שפוחד ממחשבות אלו ומנסה להרחיקן ללא הצלחה. נמנע מלצאת למקומות הומי אדם ללא ליווי ובהדרגה חייו הפכו למצומצמים יותר.
מה מהבאים הטיפול הראשוני **המומלץ** לאור מצבו?

א. Risperdal

ב. Bupropion

ג. Fluoxetine

ד. Carbamazepine

138. בבדיקה של מטופל מתעורר חשד להפרעות בתפיסה ובחשיבה.
איזה מהמבחנים הבאים **הכי פחות** יסייע לבסס את החשד?

א. רורשך

ב. TAT

ג. מבחן השלמת משפטים

ד. SIMS

139. מה ההבדל העקרוני בין טיפול תמיכתי לבין טיפול דינאמי בגישה פסיכואנליטית?

א. עיסוק באירועים חיצוניים מול עיסוק בתכנים אינטרפסיכיים

ב. טיפול שנועד למטופלים מאושפזים מול מטופלי מרפאה

ג. מֶכְוון מערכות יחסים מול מֶכְוון תפקוד

ד. ארוך טווח מול קצר טווח

140. איזו מהאבחנות הבאות **לא** כלולה ב- OCD Related Disorder?

א. Excoriation (Skin Picking) Disorder

ב. Hoarding Disorder

ג. Body Dysmorphic Disorder

ד. Reactive Attachment Disorder

141. בת 35, לוקה בסכיזופרניה במשך 10 שנים. תמונתה הקלינית מתאפיינת לאחרונה בסימנים שליליים והתפרצויות זעם. כמו-כן, נוטה להיפרפרולקטינמיה, ל- EPS ולתסמונת מטבולית.
איזה תכשיר מהבאים מהווה את הבחירה **התואמת ביותר** עבורה?

א. Periciazine 10 mg/d

ב. Risperidone 4 mg/d

ג. Olanzapine 10 mg/d

ד. Haloperidol 10 mg/d

142. דייר בהוסטל מגיע לחדר מיון מבולבל.
בבדיקות נמצא כי Na - 122, K - 4.5, CPK - 170, HB - 13.6, WBC - 7000.
מה מהבאים יכול להסביר את מצבו?

א. Diabetes Mellitus

ב. Psychogenic Polydipsia

ג. Valproic Acid

ד. Psychogenic Vomiting

143. איזה מחלקי גופם של הסובלים מ- Body Dysmorphic Disorder, מעסיק אותם **יותר**?

א. ראש

ב. איבר מין

ג. חזה

ד. ישבן

144. לאיזה מהתכשירים הבאים **אין** השפעה אנטיכולינרגית?

א. Olanzapine

ב. Promethazine

ג. Lorazepam

ד. Carbamazepine

145. בן 25, מאובחן כסובל מ- ADHD לצד התמכרות לסמים ולאלכוהול.
מה הטיפול **המועדף** בהפרעת הקשב שלו?

א. Methylphenidate

ב. Amphetamine

ג. Dextroamphetamine

ד. Atomoxetine

146. בן 35, פונה לעזרה פסיכיאטרית, עם תיאור של דיכאון לראשונה בחייו.
איזו מהתלונות הבאות עשויה במידה **גבוהה יותר** לעורר חשד, כי מדובר בהפרעה דו-קוטבית?

א. היעדר מרכיב פסיכומוטורי

ב. ירידה בתפקודים הקוגניטיביים

ג. ריצת המחשבות בראש

ד. חוסר תגובה לטיפול בציטלופרם

147. מה מנבא ציפייה חיובית בנשים לפני קיום יחסי מין בפעם הראשונה?

א. אוננות קודמת

ב. גיל מבוגר

ג. הטרדה מינית קודמת

ד. וגיניזם

148. איזו מהפרעות האישיות הבאות **שכיחה יותר**?

א. פרנואידית

ב. סכיזואידית

ג. גבולית

ד. תלותית

149. בן 35, הובא לחדר מיון בליווי בני משפחתו בזמן הסגר בשל החמרה במצבו הנפשי. נבדק בהסכמה.
בבדיקה - באי שקט, מוזנח, אפקט רגזני, סף תסכול נמוך, מחשבות שווא של יחס ורדיפה בתוכן.
לדבריו, מזהה אנשים שרודפים אותו, לכן מסתובב ברחוב בלי מסיכה ויורק עליהם כדי להדביק אותם בקורונה.
מה הצעד שיש לנקוט בו?

א. לפנות לפסיכיאטר המחוזי בבקשה להוראת אשפוז דחוף

ב. לפנות לפסיכיאטר המחוזי בבקשה להוראת אשפוז שאינו דחוף

ג. להודיע למשטרה על התנהגותו ולשחרר אותו מהמיון

ד. לחייב את בני המשפחה לבודד אותו בבית ולהזמין פסיכיאטר לביקור בית

150. בת 66, מאושפזת במחלקה סגורה ולא מגיבה לטיפול שניתן לה. מחשש לאי שיתוף פעולה לא חודש ליתיום,
אליו הגיבה טוב בעבר וכשחודש במינון של 300 מ"ג בלבד, נתגלתה רמה של 1.5 מא"ק לליטר.
מה הגורם **הסביר ביותר** לרמה כה גבוהה במינון כה נמוך?

א. דיאטה עשירה במלח

ב. התייבשות

ג. הפסקת Voltaren (diclofenac)

ד. מתן Mannitol