המועצה המדעית - ועדת הבחינות

בחינת שלב א

2022

בפסיכיאטריה

150 שאלות

בהצלחה

<u>יש לבחור בתשובה אחת בלבד עבור כל שאלה</u>

1. מהו המינון האקוויולנטי של Risperidone, ש**מעבר אליו** (שגבוה ממנו) לא נצפתה תועלת אנטיפסיכוטית וכן ניכרו תופעות לוואי, לפי מאמר הסקירה:

Examination of Dosing of Antipsychotic Drugs for Relapse Prevention in Patients with Stable Schizophrenia - A Meta-analysis JAMA Psychiatry 2021

א. 2 מ"ג
ב. 3 מ"ג
ג. 4 מ"ג
ד. 5 מ"ג

2. איזה מבין התכשירים האנטיהיסטמיניים משמש כטיפול בעיכוב אורגזמה הנובע מטיפול בSSRI's?

א. Promethazine
ב. Cyproheptadine
ג. Fexofenadine
ד. Chlorpheniramine

3. איזה **קריטריון** מבדיל בין ADHD לאפיזודה מאנית/היפומאנית?

א. הסחת דעת
ב. אימפולסיביות
ג. שטף דיבור
ד. צורך מועט בשינה

4. איזו מתופעות הגמילה מקנאביס **פחות** שכיחה?

א. ישנוניות יתר
ב. חרדה
ג. כאבי ראש
ד. צמרמורת

5. איזה מהתכשירים הבאים **לא** פועל כ Dopamine-agonist?

א. Bupropion
ב. Bromocriptine
ג. Brexpiprazole
ד. Cariprazine

6. מטופל הסובל מ Pheochromocytoma מגיע להתייעצות פסיכיאטרית. מה התלונה הנפשית השכיחה ביותר שהוא יביע?
   א. הזיות שמיעה
   ב. חרדה
   ג. דיכאון
   ד. הנמכה קוגניטיבית

7. איזו בדיקה **לא** חייבת להערך לפני טיפול בסטימולנטים בילדים ונוער?
   א. גובה
   ב. משקל
   ג. לחץ דם
   ד. ספירת דם

8. בת 35 מגיעה למיון פסיכיאטרי בליווי בעלה לראשונה בחייה וטוענת, שגבר זר מתחזה לקרובי משפחתה, על מנת לפגוע בה. לשאלת הבודק: "האם כל האנשים בסביבה מתחזים ומחליפים זהויות"? היא עונה שלא, שרק אותו רודף מתחזה לאנשים קרובים בסביבתה. באיזו תסמונת לוקה המטופלת?
   א. Fregoli
   ב. Clerambault
   ג. Cotard
   ד. Schneider

9. באיזו מבין הפרעות אישיות הבאות Splitting יותר שכיח?
   א. כפייתית
   ב. נרקיסיסטית
   ג. המנעותית
   ד. פרנואידית

10. ע"פ התאוריה הפסיכוסקסואלית של פרויד, פתולוגיה של איזה שלב תתבטא באמביוולנציה תמידית, הססנות וחוסר החלטיות?
   א. אוראלית
   ב. אנאלית
   ג. אורטראלית
   ד. פאלית

11. מי טיפל ב Bertha Pappenheim לפני פרויד?
    א. Joseph Breuer
    ב. Jean-Martin Charcot
    ג. Pierre Janet
    ד. Albert Londe

12. באיזו מהאבחנות הבאות, תופעה דיסוציאטיבית **לא** מהווה קריטריון ב- DSM-5?
    א. Acute Stress Disorder
    ב. Post-Traumatic Stress Disorder
    ג. Adjustment Disorder
    ד. Panic Disorder

13. עפ"י החוק לטיפול בחולי נפש (1991), מתי יכול הפסיכיאטר המחוזי להורות על טיפול מרפאתי כפוי?
    א. רק במקרים בהם מתקיימים תנאים לאשפוז כפוי.
    ב. רק בסיומה של תקופת אשפוז כפוי.
    ג. רק כאשר המטופל מסרב להיבדק ע"י פסיכיאטר.
    ד. רק לאחר הטבה במצבו, המאפשרת שחרורו מאשפוז כפוי.

14. כל הפרוצדורות הבאות מחייבות טיפול חוזר/המשכי **<u>פרט ל</u>**:
    א. VNS
    ב. DTMS
    ג. DBS
    ד. Ant. Cingulotomy

15. מהי הסיבה העיקרית להמלצה **לא** להוסיף SSRI's ל Clozapine?
    א. מפחיתים את רמתו
    ב. מגבירים סיכון להתכווציות
    ג. מגבירים סיכון לאגרנולוציטוזיס
    ד. מפחיתים את יעילותו באובדנות

16. בן 35, גרוש, עם חמישה אשפוזים בעברו בגין מצבים מאניים במסגרת הפרעה דו-קוטבית. לא משתף פעולה בנטילת הטיפול בין אשפוזיו. הוריו מתעניינים לגבי הפרוגנוזה. מהי התקופה הממוצעת של הפוגות (רמיסיות) בין האשפוזים העתידיים אצלו?
    א. חודש-חודשיים
    ב. שישה-תשעה חודשים
    ג. שנתיים-שנתיים וחצי
    ד. ארבע-חמש שנים

17. איזה סימן **לא** אופייני לאחר נטילת PCP?
    א. היפותרמיה
    ב. דיכאון
    ג. פרנויה
    ד. יתר לחץ דם

18. בת 30 הגיעה בליווי בעלה עם תלונות על ירידה במשקל וחולשה. בירור גופני לא העלה דבר. למעט שיחת משוב קשה בעבודה לפני כחודשיים, בעלה לא מציין טריגרים נוספים. האישה מציינת קשיי בליעה ותחושה שמשהו עומד בגרון, ולכן לא אוכלת ובקושי שותה. מהי האבחנה הסבירה ביותר עבורה?
    א. Somatic Symptom Disorder
    ב. Illness Anxiety Disorder
    ג. Conversion Disorder
    ד. Adjustment Disorder

19. אילו הפרעות תיאר פרויד במקרה של אנה?
    א. קונברסיביות
    ב. פסיכוטיות
    ג. כפייתיות-טורדניות
    ד. אוטיסטיות

20. איזה סימפטום חופף בין סכיזופרניה, הפרעה דו-קוטבית ודיכאון רבא, לפי המאפיינים הקטגוריים של DSM?
    א. הזיות
    ב. נדודי שינה
    ג. חוסר רציה
    ד. רגזנות

21. איזה גורם פסיכו-סוציאלי מהבאים הכי מעלה את הסיכון להתנהגות אובדנית אצל ילדים ובני נוער?
    א. הזנחה בילדות
    ב. פגיעות מיניות
    ג. אלימות פיזית
    ד. קשיים חברתיים

22. הפסקת איזה מבין SSRI's הבאים תגרום בסבירות **פחותה** לתסמונת גמילה?
    א. Fluoxetine
    ב. Paroxetine
    ג. Fluvoxamine
    ד. Certraline

23. איזו מההפרעות הנלוות הבאות **פחות** שכיחה בקרב מבוגרים עם הפרעת קשב וריכוז?
    א. Anxiety Disorder
    ב. Depression
    ג. Delusional Disorder
    ד. Substance use disorder

24. מהי ההגדרה הטובה ביותר ל"עיקרון המציאות" ע"פ פרויד?
    א. קיום בוחן מציאות תקין
    ב. היכולת לדחות סיפוקים מיידיים
    ג. היכולת להבחין בין טוב ורע
    ד. נטייה מולדת להימנע מכאב

25. איזה מהנתונים הבאים מאפיין הזדקנות של המוח האנושי?
    א. 37% ירידה במשקלו של המוח
    ב. ירידה בחדירות של מחסום דם-מוח
    ג. עליה בזרם דם
    ד. הרחבת סולצי

26. להתקדמות בהבנת איזו ההפרעות הבאות הביא מחקרו של Martin Seligman?
א. דיכאון
ב. PTSD
ג. OCD
ד. חרדה

27. בת 20 הופנתה להתייעצות ע"י פלסטיקאי, לאחר שעברה שני ניתוחי אף, אך ממשיכה לטעון שאפה מעוות, למרות שכולם אומרים לה, שהניתוחים הצליחו. היא משוכנעת לחלוטין, שאפה עקום ומכוער. איזה טיפול תרופתי מומלץ כקו ראשון עבורה?
א. Aripiprazole
ב. Escitalopram
ג. Buspirone
ד. Phenelzine

28. איזה מהתכשירים הבאים התגלה כיעיל יותר בשילוב עם SSRI's במאמר JAMA 2022 Combining Antidepressants vs Antidepressant Monotherapy for Treatment of Patients with Acute Depression - A Systematic Review and Meta-analysis?
א. Mirtazapine
ב. Bupropion
ג. Reboxetine
ד. Venlafaxine

29. מצבו של בן 50 הלוקה בדיכאון מז'ורי מתחיל להשתפר. מה מאפיין את הסיכון האובדני עבורו בשלב זה?
א. יורד בשל השיפור במצב
ב. מוגבר בשל חזרת יכולות התכנון
ג. לא משתנה בשלב זה ויגבר רק בעת הבניית התובנה
ד. יורד בשל התקווה, שנוצרה עקב תחילת השיפור

30. איזה מהבאים **לא** מהווה קריטריון של הפרעת אישיות נרקיסיסטית לפי DSM-5?
א. ציפייה ליחס אישי
ב. היעדר אמפתיה
ג. לביליות אפקטיבית
ד. ניצול אחרים

31. בן 25 הגיע לבדיקה, מלווה על ידי קולגה מהעבודה, כשבועיים לאחר שהותקף ונשדד בערב בדרך לביתו באיומי סכין, אך ללא פגיעה פיזית. הוא מתלונן על ירידה בריכוז וקושי בביצוע משימות בעבודה, התנתקויות פתאומיות, חרדה, וגלי חום עם זיעה, כאשר ראה תכניות TV עם אלימות. בלילה נרדם אחרי כוסית וויסקי, אך עדיין מתעורר עייף, קופץ מכל רעש, ולא יוצא מביתו בשעות החושך. מהי האבחנה הסבירה ביותר עבורו?
א. Posttraumatic Stress Disorder
ב. Generalized Anxiety Disorder
ג. Adjustment Disorder
ד. Acute Stress Disorder

32. מטופלת התלוננה, שאימה מעורבת מדי ואף חודרנית בחייה, כי מציקה לה כל הזמן לגבי כל בחירה שהיא עושה. המטפל השיב, שניתן לראות את המעורבות המופרזת של האם כביטוי של אהבה, דרכו היא מנסה ללמד את הבת כיצד לטפל בעצמה בצורה שתכין אותה לחיים עצמאיים, מבלי שתצטרך לחוות טעויות דומות לאלו שחוותה האם בחייה. באיזו טכניקה השתמש המטפל?
א. הבהרה
ב. רהפריימינג
ג. עימות
ד. טיפול פרדוקסלי

33. איזו הפרעה עשויה להתאפיין בתופעת astasia-abasia?
א. Normal Pressure Hydrocephalus
ב. Conversion Disorder
ג. Dissociative Identity Disorder
ד. Alcohol Intoxication

34. מה מהבאים **לא** מהווה חלק מהמונחים השייכים לארגון אישיות גבולית לפי Otto Kernberg?
א. חולשת אגו
ב. סופר אגו לא אינטגרטיבי
ג. שימוש בפיצול והזדהות השלכתית
ד. חרדת פרידה

35. בן 28 מתקבל בשל התקף מאני-פסיכוטי ומטופל בליתיום. הוא מפתח רעד גס. תוספת של איזה מהתכשירים הבאים בסבירות גבוהה יותר תחמיר Lithium-Induced Postural Tremor?
א. Propranolol
ב. Caffeine
ג. Lorazepam
ד. Clozapine

36. מה **פחות** נחשב לגורם סיכון להתפתחות דיכאון בקשישים?
א. הגיל עצמו
ב. מחלה כרונית
ג. התאלמנות
ד. רמה סוציו-אקונומית נמוכה

37. לאיזו מבין ההפרעות הדלוזיונליות הבאות יש פרוגנוזה **פחות** טובה?
א. סומטית
ב. ארוטומנית
ג. רדיפתית
ד. גדלותית

38. בת 30 הלוקה בהפרעה דו-קוטבית מסוג ראשון, מתקבלת בתדירות גבוהה למחלקה סגורה. איזה מבין המאפיינים הבאים **פחות** חשוב בהפיכתה ל -Rapid cycler?
א. היותה אישה
ב. תורשה של Rapid cycling
ג. התקפים דיכאוניים והיפומאניים בעברה
ד. הפסקת טיפול בליתיום

39. מה מאפיין פרכוס על רקע גמילה מאלכוהול?
א. לא מחייב ביצוע CT
ב. מתפתח לעיתים קרובות לסטטוס
ג. לרוב מופיע בחולי אפילפסיה המשתמשים באלכוהול
ד. טוני-קלוני

40. למה התכוון פרויד במושג "נרקיסיזם"?
א. השקעת ליבידו באגו
ב. התאהבות עצמית
ג. עקרון העונג
ד. קתקסיס רגשי

41. חוסר באיזה מבין הבאים יגרום לטריאדת DDD: Delirium, Dementia, Diarrhea?
א. Cyanocobalamin
ב. Niacin
ג. Thiamin
ד. Ascorbic acid

42. מה הסימפטום, שמופיע אצל **הרוב המוחלט** של הילדים הלוקים בסכיזופרניה?
א. מחשבות שווא
ב. הזיות
ג. אפקט מושטח או לא תואם
ד. דלות בתכני הדיבור

43. מהי התחלואה הנלווית השכיחה ביותר לקלפטומניה?
א. הפרעה דלוזיונלית
ב. הפרעה אפקטיבית
ג. הפרעה פוסט-טראומתית
ד. הפרעה דיסוציאטיבית

44. איזו מהאינטראקציות הבין-תרופתיות **לא** אופיינית ל-Valproic Acid?
א. מורידה רמת דיאזפם בדם
ב. מגבירה רעד בשילוב עם ליתיום
ג. מגבירה סדציה בשילוב תרופות אנטיפסיכוטיות
ד. מורידה רמת פניטואין בדם

45. גבר בן 35 סובל מהתמכרות לאלכוהול מזה 10 שנים. לאחרונה החל להביע מחשבות אובדניות. מהו הגורם **המשמעותי** ביותר מבחינת הסיכון האובדני במטופל זה?
   א. נוכחות מצב דכאוני מז'ורי
   ב. שתייה בצורת בולמוס (binge)
   ג. הפרעת אישיות אנטיסוציאלית
   ד. לחץ המשפחה לגמילה מאלכוהול

46. איזה SSRI **לא** שייך לקבוצת נוגדי דיכאון טריציקליים (TCA's)?
   א. Nortriptyline
   ב. Trazodone
   ג. Doxepine
   ד. Desipramine

47. איזה מונח **לא** נכלל ב Narrative psychotherapy?
   א. Fabula
   ב. Metaphor
   ג. Plot
   ד. Character

48. איזו סימן **לא** מופיע לאחר נטילת LSD?
   א. מידריאזיס
   ב. אקטיזיה
   ג. החזרים גדיים ירודים
   ד. חוסר קואורדינציה

49. מהו הטיפול **ההתחלתי** האופטימלי במטופל עם התקפי פאניקה לראשונה בחייו?
   א. Mirtazapine 7.5 mg + Lorazepam 1 mg
   ב. Escitalopram 2.5 mg + Alprazolam 1 mg
   ג. Paroxetine 20 mg + Quetiapine 25 mg
   ד. Venlafaxine 37.5 mg + Mirtazapine 7.5 mg

50. באיזו דרגת הפרעה נמצאים רוב המאובחנים הסובלים ממוגבלות שכלית התפתחותית (Intellectual disability)?

א. Mild

ב. Moderate

ג. .Severe

ד. Profound

51. באיזו מההפרעות הנוירולוגיות הבאות דיכאון נלווה שכיח יותר?

א. Multiple sclerosis

ב. Parkinson disease

ג. Epilepsy

ד. Cerebrovascular disease

52. איזו מבין ההפרעות הבאות **פחות** שכיחה בקרב מאושפזים בבית חולים כללי?

א. Depression

ב. Delirium

ג. Substance use disorder

ד. Brief psychotic disorder

53. מי מהבאים יפתח דיסקינזיה מאוחרת בסבירות גבוהה יותר מאחרים?

א. בת 70 המטופלת ב- Perphenazine

ב. בן 22 המפתח דיסטוניה חריפה עם Haloperidol

ג. בת 30 הלוקה בסכיזופרניה ומטופלת ב- Zuclopenthixol

ד. בן 71 המטופל ב- Ziprasidone

54. איזה מהתכשירים הבאים פועל כSSRI?

א. Mirtazapine

ב. Vortioxetine

ג. Bupropion

ד. Reboxetine

55. איזה מהסימנים הבאים **לא** יסייע להבדיל בין פרכוס אפילפטי לפרכוס לא-אפילפטי (NES)?

א. נוכחות gag reflex לאחר הפרכוס

ב. פציעה בזמן הפרכוס

ג. איבוד שליטה בסוגרים בזמן הפרכוס

ד. עליה ברמת האצטילכולין בדם לאחר הפרכוס

56. איזו מההפרעות הבאות מתאפיינת בחוסר עניין בתקשורת חברתית?

א. הפרעת אישיות פרנואידית

ב. הפרעת אישיות סכיזואידית

ג. פסיכוזה שעיקרה מחשבות רדיפה

ד. הפרעת אישיות נמנעת

57. על מה מתבססת Acceptance and Commitment Therapy?

א. הבנה שחרדה קיימת והסתכלות לא שיפוטית עליה

ב. ניסיון להבין מה מקור הבעיה

ג. התמודדות עם קיום החרדה דרך חשיפה

ד. קבלה ומחויבות להקפיד בטיפולי CBT

58. איזה מבין התכשירים הבאים **לא** משמש כטיפול להורדת משקל?

א. Metformin

ב. Topiramate

ג. Amphetamine

ד. Amantadine

59. בן 40 הסובל מטיקים והפרעה אובססיבית-קומפולסיבית עם תגובה חלקית בלבד לטיפול ב -SSRI's. הוספה של איזה מהתכשירים הבאים עשויה להיות היעילה ביותר עבורו?

א. Haloperidol

ב. Risperidone

ג. Chlorpromazine

ד. Mirtazapine

60. איזה טיפול ב OCD של ילדים ונוער **לא** מאושר על ידי ה FDA?
   א. Citalopram
   ב. Fluvoxamine
   ג. Clomipramine
   ד. Sertraline

61. איזו מההפרעות הבאות לא מהווה חלק מההפרעות הפורמליות בחשיבה?
   א. Neologism
   ב. Ineffability
   ג. Clang Association
   ד. Perseveration

62. איזו מהתופעות הפיזיות הבאות **פחות** שכיחה כתוצאה משימוש בקנאביס?
   א. עליה בתאבון
   ב. טכיקרדיה
   ג. יובש בפה
   ד. עליה בלחץ דם

63. איזה תכשיר מבין הבאים **לא** הוכח כיעיל לטיפול ב-PTSD?
   א. Paroxetine
   ב. Prazosin
   ג. Sertraline
   ד. Lorazepam

64. מה מתאר המושג קונדנסציה, לפי פרוידד?
   א. העברת כמות של אנרגיות מאובייקט לייצוג סימבולי של אובייקט
   ב. ערבוב של תחושות המעוברות לביטוי דמות מדמיין
   ג. תחושות או חשק לא מודעים המשתלבים לדמות אחת, שמופיעה בשינה
   ד. העברת תחושות לא רצויות לביטוי גופני

65. באיזו פסיכותרפיה נפוץ שימוש במטפורות?
א. תמיכתית
ב. נרטיבית
ג. חיובית
ד. קוגניטיבית

66. איזה מהבאים **לא** מהווה גורם סיכן פרה-נטלי להתפתחות אוטיזם בילוד?
א. גיל אמהי מבוגר
ב. גיל אבהי מבוגר
ג. סכרת הריונית
ד. לידה שלישית ומעלה

67. בת 34 מגיעה לחוות דעת שנייה, לאחר שרופא משפחה אבחן אצלה התקפי פאניקה והתחיל טיפול ב Citalopram לפני כשבוע. היא מרגישה החמרה ומבקשת עזרה מיידית במתן Alprazolam, כי שמעה, שהוא עזר לחברתה מהר מאד. מהי הגישה הנכונה במקרה הנ"ל?
א. ליטול Alprazolam רק כ SOS
ב. לקחת Alprazolam בהתחלה כל יום לצורך מניעת הסימפטומים
ג. להימנע מהמתן Alprazolam בכל מחיר בגלל ההתמכרות
ד. להעלות מינון Citalopram

68. איזה סימן **לא** מופיע בהרעלת סטימולנטים?
א. מיוזיס
ב. טכיקרדיה
ג. עליה בלחץ דם
ד. אגיטציה

69. מה מהבאים הוא גורם סיכון ל Obstructive sleep apnea?
א. מין נקבה
ב. רזון
ג. יתר פעילות של בלוטת תריס
ד. גיל העמידה

70. בן 25 מתקבל להסתכלות פסיכיאטרית, לאחר שהפסיד 10000 ₪ בערב בקזינו וסירב להפסיק הימורים, תוך תקיפת צוות הקזינו. הוא לא מתחרט על התנהגותו. איזו אבחנה **פחות** סבירה עבורו?

א. Gambling disorder

ב. Manic episode

ג. Intermittent explosive disorder

ד. Dissocial personality disorder

71. בן 27, מאושפז במחלקה סגורה, טוען שאנשי הצוות הם מתחזים ומחליפים פרצופים. פעם טוען שהאחות היא אמו, ופעם טוען שמנהל המחלקה הוא הדוד שנפטר. באיזו תסמונת לוקה המטופל?

א. Capgras

ב. Double personality

ג. Multiple personality

ד. Fregoli

72. בן 63, עם יד ימין דומיננטית, הסובל מיתר לחץ דם והיפרליפידמיה, מגיע למיון נוירולוגי בשל שינוי חד במצבו. לדברי אשתו, בצורה פתאומית הפך לא ענייני בתשובותיו כשנשאל על דברים פשוטים, ודיבורו לא קוהרנטי. ללא דיסארטריה. לא מסוגל לבצע פקודות פשוטות. ב CT ראש עם חומר ניגוד - אוטם לקונרי. מה מיקומו הסביר ביותר של האוטם במוחו של המטופל?

א. פרונטלי ימני

ב. אוקציפיטלי ימני

ג. פריאטלי שמאלי

ד. טמפורלי שמאלי

73. בן 31 מתקבל במאניה פסיכוטית חריפה, משתולל ואלים. הוא מסרב בתוקף לטיפול פומי. הוחלט להרגיעו במתן בנזודיאזפין תוך שריר. איזה תכשיר מהבאים יתאים יותר לסדציה מהירה?

א. Lorazepam

ב. Clonazepam

ג. Alprazolam

ד. Diazepam

74. מה ההרכב של ועדה פסיכיאטרי מיוחדת?
א. משפטן בכיר ושני פסיכיאטרים מטעם המדינה
ב. שופט בדימוס, פסיכיאטר וקרימינולוג
ג. שופט, פרקליט בכיר ופסיכיאטר
ד. המשנה ליועץ הממשלה, פסיכיאטר וקרימונולוג

75. מהי הטכניקה הנכונה בטיפול משפחתי?
א. הימנעות של המטפל משליטה בנעשה
ב. עידוד אסוציאציות חופשיות בין בני הזוג
ג. מתן אפשרות להתפרץ אחד על השני
ד. שקיפות של כל מה שקורה

76. איזה תכשיר מבין הבאים מועדף כתוספת להקלת תסמיני גמילה מבנזודיאזפינים?
א. Carbamazepine
ב. Valproic acid
ג. Lamotrigine
ד. Topiramate

77. מהי הבדיקה המומלצת בילד עם מספר אנומליות גופניות, עיכוב התפתחותי ומוגבלות שכלית?
א. רמת צרולופלסמין בשתן
ב. רמת פרולקטין בדם
ג. אנליזה כרומוזומלית
ד. פורפירין בשתן

78. איזו קבוצת תכשירים מראה יותר יעילות ב-Treatment resistant PTSD?
א. ATYPICAL ANTIPSYCHOTICS
ב. SSRI's
ג. SNRI's
ד. ANTICONVULSANTS

79. איזו מבין התרופות הבאות מומלצת יותר לטיפול בדליריום על רקע מחלת פרקינסון?
   א. OLANZAPINE
   ב. QUETIAPINE
   ג. ARIPIPRAZOLE
   ד. AMISULPRIDE

80. איזו מתופעות הלוואי הבאות מאפיינת טיפול בליתיום?
   א. עצירות
   ב. הופעת גלי U באק"ג
   ג. שינוי במטבוליזם החלבונים
   ד. ירידה בסף הפרכוס

81. על פי איזה מהבאים נקבעת דרגת החומרה של מוגבלות שכלית-התפתחותית (Intellectual disability) ב DSM-5?
   א. ציון ה -IQ
   ב. יכולת תפקודית אדפטיבית
   ג. המיקום האנטומי של הפגיעה
   ד. נוכחות תסמונת כרומוזומלית

82. בן 50 המכור לאלכוהול מתקבל למחלקה, כשהוא טוען שעבד כאן, ומנהל המחלקה הוא חברו לבילויים בנעוריו. באיזו הפרעה מדובר?
   א. Confabulation
   ב. Pseudologia fantastica
   ג. Pseudodementia
   ד. Reminiscence

83. במחלקה שיקומית הצוות נוהג להשתמש ב Token economy. לאיזו סוג טיפול שייכת השיטה הזו?
   א. חינוכי
   ב. התנהגותי
   ג. תמיכתי
   ד. פסיכוסוציאלי

84. באיזו הפרעה **לא** משתמשים ב Dopamine agonists?
   א. NMS
   ב. Parkinsonism
   ג. Hyperprolactinemia
   ד. Hypersexualiry

85. איך נקרא סימפטום המתאר התכחשות למחלה?
   א. Anosmia
   ב. Anosognosia
   ג. Apperception
   ד. Asomatopagnosia

86. איזה מבין סימנים הבאים **לא** שייך להשטחה אפקטיבית?
   א. אי יצירת קשר עין
   ב. קול מונוטוני
   ג. ירידה בתנועתיות ספונטנית
   ד. הופעה מוזנחת

87. איזה מבין הסולמות הבאים הוא השלכתי?
   א. Bender
   ב. TAT
   ג. MMPI
   ד. Clock drawing

88. מטופל שהתחיל טיפול ב Lamotrigine לפני חודשיים מתלונן על פריחה. בבדיקתו זיהית פריחה מקולופפולרית שפירה חדשה. כיצד יש לפעול?
   א. יש להפסיק מיידית את הטיפול
   ב. יש להמשיך במינון הקיים ולוודא מעקב רופא עור אחר הפריחה, שבמרבית המקרים לא תתפתח לתסמונת סטיבן-ג'ונסון
   ג. במידה והטיפול משפיע לטובה, ניתן לבצע ביופסיית עור מהירה לשלילת תסמונת סטיבן ג'ונסון, ולהמשיך טיפול במידה ונשללה
   ד. יש להפחית מינון, גם במחיר של החמרה קלינית, תוך הוספת מינון נמוך של Valproic Acid

89. מה נדרש לצורך אבחון של PTSD על פי DSM-5?
א. חשיפה אישית בלבד לאירוע עם פוטנציאל טראומטי כמו סכנת מוות
ב. לפחות סימפטום חודרני אחד (intrusive)
ג. לפחות סימפטום אחד של שינוי שלילי במצב רוח או קוגניציה
ד. לפחות סימפטום אחד של שינוי בעוררות

90. בת 58 מתקשה להפטר מחפצים שלה בעת מעבר דירה, למרות בקשות חוזרות מצד בעלה, הטוען שהבית מתמלא ב"זבל לא נחוץ לאף אחד", עד כדי שכבר אין מקום להסתובב. היא מתווכחת וטוענת שיש ערך לכל פריט שאספה. מהו הספקטרום הסביר ביותר של ההפרעה ממנה היא סובלת?
א. האוטיסטי
ב. הפסיכוטי
ג. הטראומתי
ד. האובססיבי קומפולסיבי

91. בן 40, מנהל בכיר, נשוי ואב לשלושה, סתגלן ומוצלח. במפגש עם חברים, טוען ש"ברור שיהיה משבר כלכלי והפנסיות שלנו תמחקנה". באיזה מנגנון הגנה הוא משתמש?
א. השלכה
ב. הומור
ג. הדחקה
ד. ציפייה

92. מה הפגיעה הקוגניטיבית האופיינית ב-TRANSIENT GLOBAL AMNESIA?
א. Retrograde amnesia
ב. Confusion
ג. Anterograde amnesia
ד. Autobiographic amnesia

93. האם, ובאיזה מצב, ניתן לערער על הוראת בדיקה?
א. רק כאשר מדובר בהוראת בדיקה לא דחופה
ב. כאשר הבקשה הופנתה ע"י עובדת סוציאלית או ע"י רופא, שאינו פסיכיאטר
ג. כאשר האדם פונה תוך 24 שעות בבקשה לערר לוועדה הפסיכיאטרית המחוזית
ד. לא ניתן לערער כלל על הוראת בדיקה

94. מהו ההבדל המהותי בין ילד הסובל מ SOCIAL COMMUNICATION DISORDER לילד המאובחן כלוקה באוטיזם?

א. היעדר הנמכה קוגניטיבית ב- SCD

ב. היעדר תסמינים חזרתיים ותחומי עניין מצומצמים ב- SCD

ג. היעדר פגיעה תפקודית ב- SCD

ד. היעדר ADHD כתחלואה נלווית ב- SCD

95. איזה מהתכשירים הבאים **<u>לא</u>** שייך למעכבי כולינאסטראז?

א. Galantamine

ב. Rivastigmine

ג. Tacrine

ד. Memantine

96. בן 24, לא לומד ולא עובד, השתחרר מצה"ל עם פרופיל 21, מאחר והפך פסיבי, מופנם, לא התעניין במתרחש וטען שכולם נגדו. ללא שימוש בסמים בעבר. בחודש האחרון הפך היפראקטיבי, בזבז כספים, רב עם אנשים בטענה, שהוא יותר מוכשר מכולם. מתקבל למחלקה סגורה סוער, לא מאורגן חשיבתית והתנהגותית, צועק, מתלהם, שהוא אלוהים עלי אדמות, ששומע קול של אביו המנוח, המבשר על כך. ניכר צמצום אפקטיבי. בבדיקות מעבדה - שתן חיובי לTHC (לדברי אימו, עישן קנאביס רק פעם אחת). איזו בין האבחנות היא הסבירה ביותר עבורו?

א. Schizoaffective disorder

ב. Schizophrenia

ג. Cannabis induced psychotic disorder

ד. Manic psychotic episode

97. איזה מבין הגורמים הבאים עשוי לשמש מגן מפני אובדנות בחולי סכיזופרניה?

א. חילוניות

ב. גזע לבן

ג. חשיבה מופשטת

ד. סימנים שליליים ניכרים

98. בת 37, עם היסטוריה של אונס, דיכאון, חרדה, ADHD, התקף מאני פסיכוטי קצר, שימוש במגוון סמים, כולל קוקאין, אופיאטים סינטטיים ואף הסנפת ריטלין, פגיעה עצמית חוזרת ומחשבות אובדניות, מתאשפזת בהסכמה במחלקה סגורה לראשונה בחייה, בשל תלונות דיכאוניות, מלוות בכוונות לבלוע כדורים במטרה אובדנית. בעברה אושפזה בתחלואה כפולה, שם טופלה בשילוב של Duloxetine, Amantadine, Propranolol, Trazodone, Valproic acid, Quetiapine, Clotiapine. לדבריה ולפי הרשומה, המשיכה את כל הטיפול, למעט Amantadine, בתוספת Methylphenidate ו Bupropion. בבדיקה היא שוללת אובדנות. האפקט נראה הרבה יותר קהה מאשר דיכאוני. תנועותיה איטיות ולפרקים מופיע רעד בגפיים עליונות. מהי הפעולה המתבקשת ביותר בשלב הבא?

א. הפסקת Clotiapine

ב. החלפת Quetiapine ב Risperidone

ג. העלאת Propranolol

ד. החלפת Valproic acid ב Lithium

99. ילד בן 12, סובל מזה מספר שנים מטיקים מוטוריים באים וחולפים בפנים ובצוואר. מזה שנה הופיע גם טיק יחיד ווקאלי של כחכוח. מהי האבחנה הכי סבירה עבורו?

א. Persistent motor or vocal tic disorder

ב. Tourette's disorder

ג. Transient tic disorder

ד. Stereotypic movement disorder

100. מי פיתח את המושג Signal anxiety?

א. פבלוב

ב. סקינר

ג. בולבי

ד. פרויד

101. באיזה שלב לפי אריקסון מתפתח משבר מחצית החיים?

א. Initiative vs Guilt

ב. Intimacy vs Isolation

ג. Integrity vs Despair

ד. Generativity vs Stagnation

102. איזה מבין התכשירים הבאים יגרום בסבירות גבוהה יותר לירידה במשקל?
א. Topiramate
ב. Carbamazepine
ג. Valproic acid
ד. Lamotrigine

103. באיזו קבוצת מטופלים TMS יותר בטוח?
א. נשים בהריון
ב. סובלים מהפרעות קצב
ג. סובלים מלחץ דם נמוך
ד. סובלים מסכרת

104. בן 35 בהתקף מאני-פסיכוטי חריף מתקבל על פי הוראת אשפוז כפוי ודחוף במחלקה סגורה. לא משתף פעולה, אלים, הזייתי, מסרב לטיפול, תוקף אנשי צוות. איזה תכשיר מהבאים יהווה טיפול בחירה התחלתי, על מנת להרגיעו במהירות המרבית?
א. Olanzapine
ב. Lamotrigine
ג. Quetiapine
ד. Valproic acid

105. לפי ה'TADS', במה יעיל יותר שילוב CBT עם טיפול תרופתי לאורך זמן, על פני טיפול תרופתי בלבד, לנוער הסובל מדיכאון מז'ורי?
א. באנהדוניה
ב. במצב הרוח
ג. בהפחתת מחשבות אובדניות
ד. בהפחתת אגיטציה

106. בת 42, שנים לוקה בהפרעה דו-קוטבית, שלא הגיבה לשום טיפול, פרט לליתיום. שנתיים הייתה ברמיסיה, ללא טיפול תרופתי. התקבלה לאשפוז במצב מאני חריף. עם חידוש הליתיום פיתחה Diabetes Insipidus. איזו מבין הפעולות הבאות עשויה לעזור לה?
א. חלוקת מתן ליתיום ל4 פעמים ביום.
ב. הגבלת נוזלים
ג. הימנעות ממתן Thiazide
ד. מתן Spironolactone

107. איזו מבין ההפרעות הבאות תגרום לדמנציה בסבירות **נמוכה** יותר?

א. Diabetic Ketoacidosis

ב. AIDS

ג. SLE

ד. Creutzfeldt-Jakob Disease

108. לבת 30, עם דיכאון עמיד לתכשירים אנטידיכאוניים, הוסף הורמון בלוטת התריס. איזו תופעת לוואי היא עלולה לפתח בסבירות גבוהה?

א. עליה במשקל

ב. עצירות

ג. ישנוניות

ד. הזעה

109. לאחר תאונת דרכים קטלנית, הנהג הפוגע בצורה שכלתנית, ללא הבעת רגש, מספר לשוטר על השתלשלות הדברים. באיזה מנגנון הגנה הוא משתמש?

א. Acting out

ב. Isolation

ג. Undoing

ד. Projection

110. איזה מבין מייצבי מצב רוח הבאים הכי קרדיו-טוקסי?

א. Lamotrigine

ב. Carbamazepine

ג. Valproic Acid

ד. Lithium

111. איזו הפרעה **לא** מהווה התוויה למתן חוסמי β?

א. אקטיזיה

ב. רעד כתוצאה משימוש בליתיום

ג. דיסקינזיה מאוחרת

ד. חרדה

112. איזו מתופעות לוואי הבאות יותר שכיחה עם Buspirone?
א. כאב ראש
ב. עליה במשקל
ג. הפרעות בתפקוד מיני
ד. נדודי שינה

113. איזה מבין הבאים **פחות** סדטיבי?
א. Desipramine
ב. Amitriptyline
ג. Doxepine
ד. Maprotiline

114. איזה מהתכשירים הנוירולפטיים הבאים עלול לגרום בסבירות גבוהה יותר לצהבת?
א. Perphenazine
ב. Chlorpromazine
ג. Risperidone
ד. Haloperidol

115. איזו התנהגות **פחות** אופיינית למתחזה?
א. השתמטות משירות צבאי
ב. ניסיון להימנע מאחריות פלילית
ג. צורך להרגיש חולה
ד. צורך בקורת גג

116. לאיזה טמפרמנט **יותר** אופיינית סנטימנטליות?
א. Persistence
ב. Reward dependence
ג. Novelty seeking
ד. Harm avoidance

117. מה טווח ה- IQ המאפיין Borderline intellectual functioning?
   א. 51-60
   ב. 61-70
   ג. 71-80
   ד. 81-90

118. באיזה מהבאים **<u>לא</u>** משתמשים בברביטורטים?
   א. נזעי חשמל
   ב. נרקואנליזה
   ג. התכווצויות
   ד. גמילה מ SSRI's

119. בן 28 הלוקה באפילפסיה ודיכאון עמיד, מטופל בECT. איזו מהתופעות הבאות תתרחש בסבירות גבוהה יותר **לאחר** הטיפול?
   א. החמרה באפילפסיה
   ב. Upregulation בקולטני β
   ג. הגברת זרימת דם במוח
   ד. ירידה במטבוליזם במוח

120. איזו תסמונת גנטית מתאפיינת ע"י נשיכה קשה וקומפולסיבית של שפתיים ואצבעות?
   א. Adrenoleukodystrophy
   ב. Lesch-Nyhan
   ג. Maple Syrup
   ד. Down

121. מה **לא** כלול בעקרונות של הטיפול הפסיכו-פרמקולוגי בקשישים?
   א. מתן מינונים נמוכים עד כמה שניתן
   ב. רוב התכשירים ניתנים בחלוקה שווה 3-4 פעמים ביום
   ג. פורמולציה נוזלית עדיפה בחלקם
   ד. הימנעות ממתן תרופות בערב

122. לאיזו מערכת עצבים בחיות מעבדה נגרם נזק ע"י מתן MDMA?
א. סרוטונרגית
ב. גלוטמטרגית
ג. נוראדרנרגית
ד. דופמינרגית

123. בן 16, טופל ב fluoxetine עקב אפיזודה דיכאונית והגיב ברמיסיה מלאה. לאחר כמה זמן מומלץ להפסיק את הטיפול?
א. שלושה חודשים
ב. שישה חודשים
ג. שנה
ד. שנתיים

124. מי המציא את המושג Persecutory Anxiety?
א. Eugen Bleurer
ב. Emil Kraepelin
ג. Kurt Schneider
ד. Melanie Klein

125. איזו הפרעה פסיכיאטרית יותר שכיחה בחולי סרטן?
א. הפרעת הסתגלות
ב. הפרת פאניקה
ג. דליריום
ד. דיכאון רבא

126. בת 40, שישה שבועות אחרי שנפצעה בתאונת דרכים קשה, מדווחת על ירידה במצב רוח, קושי בהרדמות ובריכוז, תלונות סומטיות מרובות, סיוטי לילה. לא חזרה לעבודה מאז התאונה. מהי האבחנה הסבירה ביותר בין הבאות?
א. PTSD
ב. Major depression
ג. Adjustment disorder
ד. Somatoform disorder

127. לאיזו תופעת לוואי **פחות** סביר שיגרום טיפול בVNS?

א. Dyspnea

ב. Bradycardia

ג. Dysphonia

ד. EPS

128. מה מבין הבאים הוא סימפטום המבטא חוסר קשב בADHD?

א. יכולת התארגנות לקויה

ב. פטפטנות מרובה

ג. נטייה להתפרץ לדברי הזולת

ד. נטייה להזיז ידיים ורגליים בעת ישיבה

129. בן 67 פונה לסקסולוג בבקשה לרשום לו Sildenafil. מה **לא** יהווה סימן לזהירות לפני מתן התרופה?

א. סכרת

ב. יתר לחץ דם

ג. מחלת לב איסכמית

ד. גילו המבוגר

130. ע"פ פרויד, עיקרון העונג ועיקרון המציאות הם אספקטים של תיפקוד ה?

א. סופר אגו

ב. אגו

ג. תת מודע

ד. לא מודע

131. איזו מבין התרופות הבאות **פחות** מתאימה לטיפול בדליריום עקב השפעתה המעוררת?

א. ZIPRAZIDONE

ב. QUETIAPINE

ג. PALIPERIDONE

ד. PIMOZIDE

132. באיזו מבין ההפרעות הבאות, SSRI's ו Clomipramine **פחות** יעילים?
א. Body Dysmorphic Disorder
ב. Excoriation Disorder
ג. Hoarding Disorder
ד. Obsessive-compulsive Disorder

133. איזה מבין הסימנים הבאים נכלל ב Schneider's first rank symptoms?
א. Avolition
ב. Audible thoughts
ג. Ambivalence
ד. Autism

134. בן 48 מטופל שנים במרפאה להפרעות מצב רוח בשל הפרעה דו-קוטבית. בביקור מתלונן על דיספוריה, העדר ספונטניות, תגובות איטיות והפרעה בזיכרון. מה מהבאים **פחות** סביר שיגרום לכך?
א. מתן ליתיום
ב. דיכאון
ג. תת פעילות בלוטת התריס
ד. היפוקלצמיה

135. מתמחה מתחילה עוברת בירור אצל מנהל המחלקה כל בוקר בשל לקויות ברישום מעקבים וקבלות. תחילה היא מגיבה בבכי ותסכול ואף שוקלת לעזוב את המקצוע, אך אט-אט משתפרת ולא מוזמנת יותר לבירור אצלו. באיזו טכניקה משתמש המנהל ע"י הפסקת זימוניה לבירור?
א. חיזוק שלילי
ב. חשיפה
ג. אכזבה
ד. ענישה

136. מהי האבחנה המבדלת העיקרית של SOCIAL COMMUNICATION DISORDER?
א. CHILD ONSET FLUENCY DISORDER (STUTTERING)
ב. EXPRESSIVE LANGUAGE DIFICIT
ג. RECEPTIVE LANGUAGE DIFICIT
ד. AUTISM SPECTRUM DISORDER

137. איזה מונח **לא** מתאר חזרה על אותם מילים וביטויים?

א. Logoclonia

ב. Perseveration

ג. Verbigeration

ד. Paraphasia

138. מהם הכללים למניעת אורטוסטזיס עם טיפול ב-MAOI?

א. הגבלת קפאין

ב. מתן תרופה פעם ביום

ג. דיאטה דלת מלח

ד. הגבלת שתיה

139. איזה מבין התכשירים הבאים יגרום **ליותר** הפרעות בתפקוד מיני, במטופל עם הפרעת חרדה?

א. Quetiapine

ב. Buspirone

ג. Reboxetine

ד. Mirtazapine

140. איזה בין TCA's הבאים **פחות** אנטיכולינרגי?

א. Imipramine

ב. Desipramine

ג. Nortriptyline

ד. Amitriptyline

141. איזה בין הבאים **פחות** מעורב הפרעות חרדה?

א. Serotonin

ב. Dopamine

ג. Acetylcholine

ד. GABA

142. מהי הדוגמה היותר מייצגת את Interoceptive exposure?
א. אדם עם התקפי פאניקה רץ במקום, על מנת להאיץ את הדופק
ב. תלמיד מוכרח ללכת לבית הספר, למרות שלא רוצה
ג. אנורקטית מורגלת לאכול כמויות קטנות של אוכל 5 פעמים ביום
ד. מטופל עם PTSD ניזכר מיוזמתו באירוע הטראומטי.

143. מהי האובססיה השכיחה ביותר בילדים ונוער המאובחנים כלוקים ב- OCD?
א. צורך בסימטריה
ב. חשש מפגיעה בזולת
ג. התעסקות במוסר ואשמה
ד. חשש מזיהומים והדבקה

144. כמה אחוזי סרוטונין, מהכמות הכוללת בגוף האדם, מרוכזים במוח?
א. 1.5%
ב. 15%
ג. 35%
ד. 75%

145. איזה סימן מהבאים מופיע בהרעלת הלוצינוגנים?
א. עור יבש
ב. מיוזיס
ג. ברדיקרדיה
ד. ראיה מטושטשת

146. מהו המנגנון, בו SSRI's גורמים לפיהוקים?
א. חולשה
ב. נדודי שינה
ג. השפעה על היפותלמוס
ד. הפחתת REM Latency

147. איזו תחלואה נפשית מהבאות **פחות** נלוות ל- Tourette's disorder?
א. Depression
ב. OCD
ג. ADHD
ד. Schizophrenia

148. בת 30, גרושה, מנסה לבנות מערכת זוגית חדשה עם בן 28. במהלך הפגישה איתה הוא מעיר לה, שהיא "נראית לא משהו היום". היא לא ענתה לו כלום. כשחזרה הביתה, החלה לצעוק על ילדיה: "שוב עשיתם בלגן! מתי זה כבר ייגמר?". באיזה מנגנון הגנה מהבאים השתמשה האם?

א. רציונליזציה

ב. השלכה

ג. התקה

ד. הכחשה

149. מהו הביטוי של Orgasmic Anhedonia?

א. העדר חשק מיני

ב. העדר אורגזמה

ג. העדר תחושת אורגזמה

ד. מועקה נפשית בעת אורגזמה

150. איזה מהתכשירים הבאים עלול יותר להגביר את ההתכנות של Stevens-Johnson syndrome בשילוב עם Lamotrigine?

א. Escitalopram

ב. Valproic acid

ג. Risperidone

ד. Lorazepam

בהצלחה