רפואה דחופה
אוקטובר 2020

התמחות ישירה

שאלון 2

שאלה 1

בן 74, ברקע: יל"ד.
בעברו ניתוח I BILLROTH לפני שנים רבות.
פונה למלר"ד לאחר אירוע סינקופה.
בבדיקה רקטלית נמצא דם טרי.

לאחר הכנסת עירוי, ובדיקות דם, כולל סוג דם, מהי הבדיקה הבאה?

א- סיגמואידוסקופיה דחופה
ב- CT בטן עם חומר ניגוד IV+PO
ג- CTA בטן
ד- NASOGASTRIC TUBE

שאלה 2

בן 40 ללא כל רקע רפואי

פונה בשל חולשה, צימאון ושתן מרובה .במיון ללא חום.

בדיקת גזים מצורפת:

Urea	Cr	pH	HCO3	DEX
49	1.2	7.34	22	432

מה הטיפול התרופתי?

א- PO METFORMINE באישפוז

ב- PO METFORMINE ושחרור

ג- PO GLIPIZIDE באשפוז

ד- PO GLIPIZIDE ושחרור

שאלה 3

באירוע טוקסיקולוגי המוני,

מי מאנשי הצוות הבאים צריך להתמגן

עם **חליפת מגן, מסכה עם פילטר חיצוני, כפפות וערדליים**

א- רופא באזור מיועד לחולים במצבי בינוני בתוך המלר"ד

ב- אחות באזור טיהור מחוץ למלר"ד

ג- רופא מנהל האירוע

ד- רופא מד"א באתר הפיצוץ של חומר כימי לא ידוע



שאלה 4

בת 35, בריא בד"כ, פנה בשל פריחה על הקרקפת,
מראה הפריחה בתמונה.



מה הטיפול?

א- permethrin
ב- ketoconazole
ג- doxycycline
ד- prednison

שאלה 5

בן 78 פנה בשל קושי בדיבור כשעה טרם קבלתו.

בבדיקה motor aphasia , מבצע פקודות.

CT ללא עדות לדמם.

מה כלי הדם הפגוע ?

א- Middle cerebral artery

ב- Posterior cerebral artery

ג- Basilar artery

ד- Anterior cerebral artery

שאלה 6

בן 24,מזה 3 ימים חום 39, וכאבי גרון. מתקשה לאכול ולשתות.
בבדיקה: טריזמוס. קול עמום (POTATO VOICE).
במעבדה WBC 9,500, 85% נויטרופילים



מה השלב הבא?

א- אשפוז לניתוח





ב- NEEDLE ASPIRATION

ג- IV CEFTRIAXONE באשפוז

ד- CT צוואר עם חומר ניגוד

שאלה 7

להלן צילומי חזה של מטופלים עם כאב בחזה המקרין לגב.
מי מהם זקוק ל CT בדחיפות?

א-		ב-	
ג-		ד-	

שאלה 8

במהלך החייאה בילד בן שנה נכשל ניסיון להכניס INTRAOSSEOUS NEEDLE

ל PROXIMAL TIBIA מימין ומשמאל.

באיזה אתר ניתן לנסות שוב להכניס INTRAOSSEOS NEEDLE?

א- ניסיון נוסף ב PROXIMAL TIBIA

ב- DISTAL LATERAL MALEOLLUS

ג- DISTAL FEMOR

ד- DISTAL RADIUS

שאלה 9

מה מהבאים הוא התווית נגד (CONTRAINDICATION) לטיפול FIBRINOLYTIC?

א- טיפול ב COUMADIN עם 1.6 INR

ב- אירוע מוחי איסכמי לפני 3 חודשים

ג- דימום מכיב פפטי לפני חודש


ד- כריתה של מניגיומה בגומה אחורית לפני 4 חודשים

שאלה 10

בן 60, לאחר תאונת דרכים.

בבדיקה: שפשוף שטחי בעור באזור מותן שמאל.

בוצע CT בפרוטוקול טראומה. להלך חתך מהבדיקה:



מה הטיפול המשך הטיפול ?

א- אנגיוגרפיה

ב- התערבות ניתוחית

ג- ציסטוסקופיה והשתלת סטנט


ד- השגחה

שאלה 11

לחץ דם	חום	סטורציה
130/70	36.5	97%

בן 32, בריא.
הגיע בשל פלפיטציות, ואירוע פרה סינקופה

בהגעתו למלר״ד בהכרה מלאה.
בוצע אקג, מצורף.



מה הטיפול ?

א- METOPROLOL 5mg
ב- VERAPAMIL 5mg
ג- CARDIOVERSION
ד- DIGOXIN 0.5mg

שאלה 12

המטופלים הבאים פנו למלר"ד בשל כאבי בטן והקאות.

מהו השילוב הנכון בין התלונה, ובדיקת הבחירה (הדמיה)?

(MATCH THE COMPLAINT WITH THE APPROPRIATE IMAGING)


	תלונה ורקע	בדיקה פיזיקלית/מעבדה (חלקית)	הדמיה
א-	בן 32, בעברו כריתה של מעי. כאבים דיפוזיים, 2 הקאות.	בטן תפוחה. רגישות דיפוזית. CRP 12.	צילום בטן, עם חומר ניגוד מרוכז.
ב-	בן 53, בריא. יומיים כאבים בבטן תחתונה, שילשול אחד.	רגישות ו GUARDING ב LLQ. WBC 13.	US בטן תחתונה.
ג-	בת 42. בריאה. BMI 32. מאתמול כאבים סביב הטבור, שנדדו ל RLQ.	רגישות בנקודת McBURNEY. CRP 30.	CT בטן עם חומר ניגוד IV, ללא PO.
ד-	בן 63, MULTIPLE MYELOMA, קראטינין 1.4, S/P CHOLECYSTECTOMY.	רגישות אפיגסטרית. ליפאז 3000.	CT בטן עם חומר ניגוד IV.

שאלה 13

בן 13. פונה למלר"ד כרבע שעה לאחר חבלה בשיניים.

המראה בתמונה.

השיניים נשמרו במי ברז.



מה הפעולה שיש לבצע

לפני החזרת השיניים למקומן?

א- שטיפה קצרה במי ברז.

ב- חיטוי השורש בכלורהכסידין על בסיס מים.

ג- השריה של השן בתמיסת Hank's למשך שעה לפחות.

ד- הפניה לכירורג פה ולסת, במוסד הרפואי הקרוב ביותר.

שאלה 14.

בן 45. במהלך החלפת צנתר דיאליזה הופיעה בלבול חריף אי שקט.
בהמשך נצפה פרכוס טוני קלוני שנמשך מס' דקות.

בבדיקה ישנוני חולשה בפלג גוף שמאל.

מצורפת בדיקת CT .



מה השלב הבא?

א- העמסת IV phenytoin

ב- דיאליזה דחופה


ג- אשפוז לברור כולל EEG

ד- הפנייה לטיפול בתא לחץ

שאלה 15

בת 54, לאחרונה אובחנה עם INVASIVE DUCTAL CARCINOMA.
לפני חודש עברה ניתוח
LT BREAST LAMPECTOMY + AXILLARY LYMPH NODE DISSECTION.
עדיין לא התקבלה תשובה פתולוגית. לא התחילה טיפול כמוטרפי.
פנתה עקב נפיחות באקסילה משמאל. ללא חום.
בבדיקות מעבדה אין עליה במדדי דלקת.
מראה האקסילה ו POCUS בתמונות:





מה הפעולה הבאה?
א. CT כל גופי לברור גרורות
ב. אישפוז לניתוח ניקוז וטיפול אנטיביוט
ג. NEEDLE ASPIRATION
ד. PO CEFALEXINE

שאלה 16

בן 80.

ברקע: RHUMATOID ARTHRITIS, סוכרת, יתר לחץ דם.

מטופל באנלדקס, קרדילוק , אספירין, מטוטרקסט, מטפורמין.

פונה בשל כאבים עזים במותן ימין ופריחה מזה כשבוע

מראה הפריחה בתמונה.



מה הטיפול?

א- פרדניזון , טלפסט.

ב- אציקלוויר, פרקוסט.

ג- איבופרופן, טלפסט , ופרדניזון.

ד- אציקלויר, פרקוסט, טלפסט.

שאלה 17

בת 20, בריאה, ללא טיפול תרופתי.

מתלוננת על כחלון של האצבעות בחשיפה לקור ומצבי לחץ.

תמונת כפות הידיים מצורפת:



מה המשך הניהול?

א- טיפול בחוסמי תעלות סידן.

ב- שחרור עם המלצה לשמירת חום כפות הידיים.

ג- יעוץ ראומטולוגי בקהילה בהקדם.

ד- אישפוז לטיפול בפרוסטוציקלינים.

שאלה 18

בן 8 חודשים בריא. מחוסן לגילו, הגיע בשל שיעול וקוצר נשימה.

בבדיקתו:

לחץ דם	דופק	סטורציה	חום
98/67	102	RA %94	38

מנוזל, מתנשם, משתעל.

בהאזנה לריאות צפצופים וחרחורים מפושטים.

מה הטיפול?

א- חמצן במסכה

ב- אינהלציה של EPINEPHRINE

ג. PO DEXAMETHASONE

ד. תמיסת SALINE לנחיריים ושאיבה של ההפרשות

שאלה 19

מה מהממצאים הבאים מעלה חשד להתעללות (ABUSE)
בקשיש וחסר ישע ?

א-		ב-	
ג-		ד-	

שאלה 20

בת 81. ברקע AF. מטופלת בנוגדי קרישה, לא ברור איזו תרופה.
זקוקה לניתוח דחוף ויש לתת ANTICOAGULANT REVERSAL.

מה הטיפול?

א- PROTHROMBIN COMPLEX CONCENTRATE

ב- CRYOPRECIPITATE

ג- IDARUCIZUMAB (PRAXBIND)

ד- FRESH FROZEN PLASMA

שאלה 21

מה מהנוזלים הבאים יעלה בצורה הטובה ביותר את הנפח הווסקולרי.
(INTRAVASCULAR FLUID COMPARTMENT)?

א- 1000ml DEXTROSE 5%.
ב- 1000ml RINGER LACTEATE.
ג- 500ml ALBUMINE.
ד- 500ml WHOLE BLOOD.

שאלה 22

בת 30, בריאה, שבוע 10 להריונה הראשון . חזרה לפני יומיים מהודו.

מתלוננת על כאב בטן עוויתי ושלשול דמי, מלווה בחום 38.

מדווחת שאין לה תאבון, אך מקפידה לשתות.

לחץ דם	חום	דופק	סטורציה
100/78	377.	95	94%

מה הטיפול?

א. שחרור עם CIPROFLOXACIN.

ב. טיפול ב CIPROFLOXACIN ותרביות צואה באשפוז.

ג. מנה בודדת של AZITHROMYCIN, ושיחרור.

ד. שחרור עם LOPERAMID ותרביות צואה.

שאלה 23

בן 40, מתלונן על כאב גב מזה שבוע.

בבדיקה נראית תבנית ההליכה הבאה (בסרטון):

מהו השורש הפגוע?

א- שורש עצב L1 מימין.

ב- שורש עצב L3 משמאל.

ג- שורש עצב L4 מימין.

ד- שורש L5 משמאל.



שאלה 24

להלן פצועים מהתהפכות אוטובוס.
מי מהפצועים בעדיפות ראשונה לטיפול?

א- בן 35, מחוסר הכרה, חבלת פנים, נושם 30 נשימות/דקה
ב- בת 35, בהריון, בהכרה, חבלת בטן
ג- בת 5, מחוסרת הכרה, 4 נשימות/דקה, לא נמוש דופק
ד- בן 80, בהכרה, שבר פתוח בשוק, ללא שטף דם פורץ

שאלה 25

בת 47, ברקע: תת פעילות בלוטת התריס, מטופלת ב ELTROXIN.
עדיין יש וסת.
לאחרונה חולשה וחוסר סבילות למאמצים.
בברור בקהילה נמצא המוגלובין 8 ,MICROCYTIC ,HYPOCHROMIC.
שוללת דימום חריג כלשהו.
נשלחה למלר"ד לצורך קבלת דם.
בקבלתה יציבה, מלינה על מעט חולשה. בספירת דם חוזרת המוגלובין 7.8.

מהו המשך הברור והטיפול?
א– בדיקה רקטלית ואשפוז לבירור אנמיה
ב–בדיקת ברזל, פריטין, חומצה פולית, B12, TSH, ומתן מנת דם
ג– שחרור לבירור אמבולטורי
ד– הפניה למיון נשים

שאלה 26

מה הדרך הטובה ביותר לתת ANALGESIA לתינוק בן שבועיים,

בעת התקנת עירוי פריפרי?

א- EMLA

ב- LET

ג- ORAL SUCROSE

ד- PO PARACETAMOL

שאלה 27

בת 68 ברקע סקלרודרמה.

מטופלת בשבוע האחרון טופלה בפרדניזון עקב פריחה אלרגית.

פונה בשל בלבול ובריחת שתן.

לחץ דם	חום	דופק	סטורציה
185/95	37.7	95	91%

WBC	HB	PLT	Cr
14000	8.5 קודם -11	95000	3.2 קודם-1.1

מה הטיפול?

א- PO CAPTOPRIL

ב- IV HYDROCORTISONE

ג- IV LABETOLOL

ד- IV FUROSEMIDE

שאלה 28

לאחר לידה וגינלית בהולה במלר"ד התינוק שנולד לא נושם.
מה הפעולות שיש לבצע?

א- DEEP TRACHEAL SUCHTION.
ב- להנשים את היילוד עם אמבו מחובר ל HIGH FLOW O2.
ג- להמתין 3 דקות לפחות, לפני חיתוך חבל הטבור.
ד- לנגב את היילוד, לשפשף את גבו, ולעטוף בשמיכה חמה.


שאלה29

איזה מהמצבים הבאים מהווה סיכון ל AVASCULAR NECROSIS של ראש הירך?

א-	ב-	ג-	ד-
			

התמונות לשאלה 29

א.




ב.



התמונות לשאלה 29

ג.



ד.



שאלה 30

בן 4, מגיע למלר"ד לאחר נפילה עם חתך במצח.
אין גישה ורידית והאם מסרבת לפתיחת וריד.
הילד בוכה ואינו משתף פעולה בבדיקה.



מה הטיפול המתאים?

א- ORAL CODEINE

ב- IM FENATANYL

ג- INTRANASAL KETAMINE

ד -INTRANASAL MIDAZOLAM

שאלה 31

בת 32, בהריון, טרימסטר ראשון. בריאה. ידוע על רגישות לחומר ניגוד ופניצילין. בעברה תריסיות יתר (hypertyroidisem).

מתלוננת על חולשה כללית, חרדה אי שקט, שלשול, נשירת שיער. בבדיקתה:

לחץ דם	חום	דופק
180/80	39.5	130

באי שקט, מזיעה, עור חם ולח .

אק"ג – פרפור עליות (atrial fibrilation)

ציון סולם קליני ברוץ' וורטופסקי -55

Burch and Wartofsky Point Scale (BWPS)

מה טיפול הראשוני המתאים?

א- מתימזול.

ב- הידרוקורטיזון.

ג- יוד.


ד- יש להמתין לתוצאות תפקודי בלוטת התריס.

שאלה 32

אסיר בן 30 בריא, שובת רעב מופנה למיון עקב הקאות חוזרות. בהגעתו בהכרה, נראה מותש, לא מתנשם. לחץ דם 115\70 . בבדיקה ראשונית בולטת חולשה ב 4 גפיים ורפלקסים מוחלשים.

אק"ג מצורף:

מהי הפרעה המטבולית של המטופל ?



א- היפוקלצמיה.

ב- היפופוספטמיה.

ג-היפרנטרמיה.

ד- היפוקלמיה.

שאלה 33

בן 19, לאחר קטטה ודקירה בודדת בצוואר.

בבדיקה:

לחץ דם	דופק	sat
100/70	110	99%RA

בהכרה מלאה. מדבר, GCS 15

ישנו חתך עמוק בצוואר, עם דימום פורץ .



מה הצעד הבא?

א- לחץ מקומי בעזרת היד, וניתוח דחוף.

ב- חבישת לחץ ואנגיוגראפיה דחופה.

ג- חבישת לחץ ו CTA.

ד- לבצע אינטובציה .


שאלה 34

בן 54, התחשמל בעת שהתקין מנורה בביתו.

הרגיש זרמים בכל גופו. לא איבד הכרה.

לא נפל ולא נחבל. בבדיקה אין כוויות.

אקג בקבלתו מצורף.



מה הפעולות במלר"ד?

א- שחרור

ב- אישפוז להשגחה

ג- בדיקת טרופונין בקבלתו

ד- בדיקת טרופונין 6 שעות מהאירוע

שאלה 35

בן 83 פנה בשל כאבים בשוק ימין . ברקע לאחר נפילה מסולם לפני 3 שבועות מאז מרותק למיטה . ידוע על שבר דחיסה בחוליה D9.

בבדיקה שוק ימין רגישות חום מקומי ונפיחות (4 ס"מ) ביחס לשמאל.

בבדיקת POCUS ללא עדות לDVT.D-dimer- חיובי.

מה המשך הטיפול?

א- מעקב כירורג כלי דם בקהילה

ב- אשפוז והתחלת טיפול NOAC

ג- שחרור עם המלצה לבדיקת US ורידים עמוקים בעוד שבוע

ד- אשפוז והתחלת טיפול ב HEPARIN בחפיפה עם WARFARIN

שאלה 36

בת 28 פנתה בשל צריבה דחיפות ותכיפות במתן שתן.
ללא מחלות רקע.
במשפחה 3 אחיות עם G6DP .
בסטיק שתן WBC 250

מה הטיפול?

א- ZINNAT
ב- RESPRIM
ג- SEDURAL
ד- NITROFURANTOIN

שאלה 37

מה מהווה סמן מוקדם לשוק סמוי (OCCULT SHOCK) בפצוע טראומה?

א- VENOUS LACTATE

ב- VENOUS BASE EXESS

ג- MIXED VENOUS 02 SATURATION

ד- VENOUS FIBRINOGEN

שאלה 38

מה מהבאים מעלה חשד להתעללות בילד CHILD ABUSE?

א- שבר בפמור בילד בן 3.

ב-שבר בקלוויקולה בילד בן 5.

ג- שבר בהומרוס בילד בן שנה.

ד- שבר לינארי בגולגולת בילד בן שנתיים.

שאלה 39


בן 30, פונה בשל פלפיטציות. ללא כאבים בחזה, ללא קוצר נשימה.

מדדים בקבלתו:

לחץ דם	דופק	סטורציה
120/70	180	96% RA

דופק נמוש.

במוניטור:



מה הטיפול?

א- DEFIBRILLATION 200J

ב- CARDIOVERSION 100J

ג- IV AMYODARONE 150 mg


ד- VAGAL MANUVER

שאלה 40

בן 87 התקבל באי ספיקה נשימת חדה בזמן האוכל.

בקבלתו סטורציה 79%.

צילום חזה מצורף.



מה ההסבר להיפוקסיה?

א- Hypoventilation of Rt lung

ב- V-Q mismatch

ג- Air trapping of Lt lung

ד- Right to Left shunt

שאלה 41

בן שנה הובא למלר"ד ע"י האם עם תלונה על ישנוניות.

בבדיקה: ישנוני, דופק פריפרי נמוש.

דופק	נשימות
70	14

מה הפעולה הנכונה?

א- בולוס נוזלים 20 מ"ל לק"ג

ב- פתיחת וריד ומתן אטרופין במינון 0.02 מ"ג/ק"ג.

ג- פתיחת וריד ומתן אדרנלין במינון 0.01 מ"ג/ק"ג.

ד- וידוא נתיב אוויר פתוח ומתן חמצן.

שאלה 42

בן 18, צורח, באי שקט פסיכומוטורי,

מגיע עם חבריו לאחר שימוש בסם לא ידוע

בבדיקתו:

דופק	לחץ דם	חום
130	200/110	40°C

באי שקט ,מזיע ,אישונים שווים מגיבים לאור , עור אדום וחם.

לאחר מתן DIAZEPAM נרגע.

בבדיקה חוזרת של לחץ דם 223/122.

מה הטיפול?

א- IV LABETALOL

ב- IV VERAPAMIL

ג- IV PHENTOLAMINE

ד- IV ISOSORBIDE

שאלה 43

בפציעה חודרת בבית החזה,

מה הדרך **הטובה ביותר** לשלול קרע של הסרעפת?

א- צילום חזה ובטן לאחר הכנסת זונדה.

ב- CT חזה ובטן עם חומר ניגוד בשתייה.

ג- לפרוסקופיה חוקרת.

ד- טורקוטומיה פתוחה.



שאלה 44

בנוסף לאינהלציות, מה הטיפול ב STATUS ASTHMATICUS,
במטופל עם הכרה מעורפלת?


א- IV MAGNESIUM 1gr
ב- IV KETAMINE 1mg/kg
ג- IV EPINEPHRINE 1mg
ד- BIPAP

שאלה 45


בת 33, בריאה. שבוע 35 להריונה.

פנתה בשל כאבי בטן. חוברה לניטור עוברי.


איזה מהתרשימים הבאים מצביע על סבל עוברי?




א



ג



ב



ד

שאלה 46

בן 18, ברקע: סכרת TYPE I

פונה בשל הקאות מרובות, וכאבי בטן

בקבלתו 160 mg/dL DEX

בשתן KET+++

בדיקת גזים בדם מצורפת:

K	Na	pCO2	pH	HCO3
5.1	133	25	7.12	9

מה הטיפול?

א- IV Insulin 12 U, IV Saline 0.9% 2000 ml

ב- IV saline 0.9% 1000 ml, IV bicarbonate 50 ml

ג- IV glucose 5%, אחרי שגלוקוז יעלה מעל 200 – IV Insulin 12 U

ד- IV saline 0.9% with 5% glucose 2000 ml ו IV Insulin 12 U

שאלה 47

בן 70 , משקל 70 בגובה 1.70 מטר מונשם לאחר התקף אסטמה.

מדדי הנשמה –

TV	PEEP	FIO2	RR
500	5	1.0	14

בבדיקתו: גודש צווארי ניכר, צפצופים דיפוזיים על פני הראות

סימנים חיוניים-

סטורציה	חום	לחץ דם	דופק
97%	36.5	70/50	115

המנשם מתריע על לחץ הנשמה גבוה. תמונת מסך המנשם מצורפת.



מה הפעולה הבאה?

א- אינהלציה אארוונט ונטולין במהלך הנשמה .

ב- עירוי אדרנלין 4 מק"ג לדקה, וסטרואידים.

ג- 2 ליטר נוזלים ועירוי מגנזיום.

ד- ניתוקהמכשיר למספר שניות וקביעת RR-10.

שאלה 48

בן 25 מטופל בחדר טראומה לאחר חבלת ראש.

בבדיקה: פוקח עיניים בתגובה לכאב, נאנח,

תגובה מוטורית לכאב בתמונה:

מהו ה GCS (GLASGOW COMA SCALE) של הפצוע?

א. 4

ב. 6

ג. 8

ד. 10



שאלה 49

עובד מעבדה בפקולטה לפיזיקה באוניברסיטה,
פונה לאחר שבמעבדה נשפך איזוטופ הפולט קרינת ביטא (Beta).
מה המיגון המינימלי שלא ידרוש המשך ברור?

א- סרבל בד, וכפפות.
ב- ציוד מגן המכיל עופרת.
ג- לבוש בעל תכולת מימן גבוה (hydrogen).
ד- עבודה עם כפפות דרך קיר זכוכית

שאלה 50



בצילום כתף ,לאחר רדוקציה של פריקה קדמית,
נראה הממצא בתמונה:

מה הפעולה הבאה?

א- ניסיון חוזר לרדוקציה תחת סדציה

ב- מתלה ליד ,שחרור למעקב אורתופד בקהילה

ג- CT כתף ,והחלטה על המשך הטיפול לפי התוצאה

ד- יעוץ אורתופדי דחוף לצורך טיפול ניתוחי

שאלה 51

איזה מצילומי הרנטגן מעלה חשד להתעללות (ABUSE)?

א-	ב-	ג-	ד-
			

שאלה 52

חקלאי הגיע למלר"ד עם קוצר נשימה.

בבדיקתו ריור יתר, דמעת, אישוני סיכה.

במהלך הבדיקה החל להקיא ולשלשל

מה מהטיפולים הבאים הוא טיפול חיוני לחולה?

א- Gastric Lavage

ב- Physostigmine

ג- Pralidoxime

ד- Activated Charcoal

שאלה 53

בן 45. ננשך על ידי החתול שלו.
לא זוכר מתי חוסן לטטנוס.
מראה היד בתמונה.



לאחר חיטוי הפצעים, מה הטיפול?


א- אנטי טטנוס, חיסון לכלבת Cephalexin
ב- אנטי טטנוסAugmentin ,
ג-חיסון לכלבת Cephalexin
ד-אנטי טטנוס

שאלה 54




איזה מתרשימי האקג הבאים מתאים ל POC ECHO המצורף?


א




ב



ג




ד




שאלה 54

א


I
aVR
V1
V4
II
aVL
V2
V5
III
aVF
V3
V6
II


ב


I
aVR
V1
V4
II
aVL
V2
V5
III
aVF
V3
V6


aVR
V1
V4
II
aVL
V2
V5
III
aVF
V3
V6
II

ג




שאלה 54


I
aVR
V1
V4
II
aVL
V2
V5
III
aVF
V3
V6

ד

שאלה 55

דיירת רחוב מגיעה עם חולשת צד חדשה.
איזה ממצא בבדיקה פיזיקלית, או בבדיקות העזר,
מעלה חשד לאנדוקרדיטיס?

א-		ב-	
ג-		ד-	

שאלה 56

בת 85. ברקע: HYPOTHYROIDISM. בדיקת TSH אחרונה בקופת חולים 120. לא נוטלת תרופותיה.


מפונה למלר"ד מערפלת הכרה.

בקבלתה:

SAT	דופק	חום	לחץ דם
92%	38	35.0	80\50

קולות לב מרוחקים, ריאות נקיות, בצקות NON-PITTING ברגלים, מניעה 4 גפיים.

אקג מצורף.



בנוסף לחימום, מה הטיפול?

א- PO LEVOTHYROXIN 200 mcg

ב- IV LEVOTHYROXIN 100mcg

ג- IV DOPAMINE 10mc/kg/min

ד- IV HYDROCORTISONE 100 mg + IV LEVOTHROXIN 200 mcg

שאלה 57

מה תהיה אינדיקציה להנשמה במטופל עם התקף אסטמה חריף?

א- סטורציה 88% באויר חדר, שעלתה ל 93% עם חמצן ב NASAL CANULA.

ב- 24 נשימות לאחר טיפול באינהלציות AEROVENT+VENTOLIN X 3/hr .

ג- PCO2 43mmHg בגזים, לאחר אינהלציות VENTOLIN X 3/hr+ AEROVENT.

ד- אין שיפור ב EXPIRATORY WHEEZING, שעה לאחר מתן סטרואידים.

שאלה 58

בן 35 לאחר תאונת דרכים.

בהכרה. מדבר ברור.

לא מזיז את רגל שמאל, לא חש ויברציה ולא מזהה מיקום הבוהן.

לא חש חום או כאב ברגל ימין .

מה האבחנה?

א- ANTERIOR CORSD SYNDROME

ב- BROWN SEQUARD SYMDROME

ג- QHAUDA EQUINA SYNDROME

ד- SPINAL SHOCK

שאלה 59

בת 20 מתלוננת על כאבי בטן ובחילות.

בלעה חבילה שלמה של כדורי אקמול לפני יום וחצי.

בקבלתה נלקחת רמת אקמול, ותפקודי כבד.

מה הטיפול במצבים הבאים?

	תנאי	**טיפול**
א-	בכל מקרה	לתת IV Acetylcysteine
ב-	רמת אקמול גבוהה	לתת IV Acetylcysteine
ג-	אנזימי כבד גבוהים	לתת IV Acetylcysteine
ד-	אנזימי כבד גבוהים	טיפול תומך ויעוץ הפטולוגי

שאלה 60





בן 30 לאחר תאונת אופנוע.

חבלה מבודדת בשוק שמאל.

בבדיקה- פצע פתוח בשוק, כפי שנראה בתמונה.

עצם לא נראית בבדיקת הפצע.

צילום רנטגן מצורף.

מה ההגדרה של השבר?

א- שבר פתוח GUSTILO ANDERSON II

ב- שבר פתוח GUSTILO ANDERSON IIIA

ג- שבר פתוח GUSTILO ANDERSON IIIB

ד- SIMPLE COMINUTED FRACTURE

שאלה 61

מה דרגת השבר על פי קלסיפיקציה

ע"ש סלטר האריס

א- II

ב- III

ג- IV

ד- V




שאלה 62

בת 35 לאחר תאונת דרכים עם חבלת חזה,

מתלוננת על קוצר נשימה וכאבים בחזה.

מטופלת במסכת חמצן

מצורף חתך מייצג מ CT חזה



דופק	לחץ דם	סטורציה	חום
110	92/70	93%	36.9

מה הטיפול ?

א- mechanical ventilation

ב- IV SALINE 0.9% 30cc/kg

ג- חמצן באמצעות מסכה, ואנלגטיקה

ד- IV HYDROCORTISON

שאלה 63

בת 69, מגיעה עם היפוגליקמיה בביתה. מדדה DEX 54mg/dL.
טופלה בגלוקוג'ל.

בקבלתה ללא תלונות. DEX 213 mg/dl.

איזו מהתרופות הבאות מחייב אישפוז להשגחה?

א- מטופל במטפורמין

ב- מטופל בexenatide

ג- מטופל בGLIPIZIDE

ד- מטופל REGULAR INSULIN

שאלה 64


בת 32 בהריון, לאחר שהתמוטטה בביתה.
בכניסה למלר"ד איבדה דופק. צוות מדא התחיל CPR.
בבדיקתה: ללא דופק.
4 דקות מתחילת ההחייאה במוניטור יש אסיסטולה.
הרחם נמוש נמצא כ 5 ס"מ מעל הטבור.

מה הפעולה הבאה?

א. המשך עיסויים ומתן אדרנלין לפי פרוטוקול PEA/ASYSTOLE.
ב. קיסרי חרום עם חתך רוחבי תחתון.
ג. קיסרי חירום עם חתך אורכי בקו האמצע.
ד. המשך CPR וקריאה לצוות מיומן מחדר לידה.

שאלה 65

בת 69, ברקע מחלת לב איסכמית.
מתלונת על ראיה כפולה, בעיקר במבט לשמאל.
בדיקה פיזיקלית בתמונה המצורפת.
יתר הבדיקה הנוירולוגית תקינה.
הדמיה מוחית ללא ממצא.



מה האבחנה?
א- CVA
ב- VI NERVE PALSY
ג- III NERVE PALSY
ד- PITUITARY ADENOMA

שאלה 66

בן 55 ברקע השמנת יתר, יל"ד, HOCM. מתלונן על קוצר נשימה, מתקשה לשכב פרקדן.

לחץ דם	דופק	סטורציה
149/90	110	88%

סימנים חיוניים:

.

המטופל מקבל פוסיד, איזוקט תת לשוני ומחובר ל BIPAP.

כעבור כשעה האחות מדווחת שהמטופל עם ל"ד 75\55.

כיצד נטפל?

א. דופמין.

ב. בולוס נוזלים.

ג. פנילאפרין

ד. דובוטמין

שאלה 67

בן 50 ברקע סכרת, יל"ד ועישון. פנה למוקד רפואי בקהילה בשל הקאות מרובות, וכאבים בחזה. בדיקת טרופונין במוקד היתה שלילית. בשל התמדה של התלונות נשלח למלר"ד.

סימנים חיוניים בקבלתו:

לחץ דם	חום	דופק	סטורציה
160/90	37.4	110	94%

אק"ג וצילום חזה בשיקופיות הבאות-

מה השלב הבא ?


א- חוסמי בטא, CT חזה אנגיו.

ב- CT חזה + צוואר עם חומר ניגוד IV.

ג- מתן אספירין, יעוץ קרדיולוג במלר"ד.

ד- המלצה לברור קרדיולוגי אמבולטורי.

שאלה 67





שאלה 67

שאלה 68

בן 60 לאחר נפילה מסולם. נחבל באזור העכוז, ומתלונן על כאבים עזים.
ללא חבלת ראש, או חבלות משמעותיות אחרות.
בקבלתו: בהכרה. ללא רגישות בצוואר, או מגבלה בתנועה.
ללא קיפוח דרכי אויר. ללא חבלה בחזה. כניסת אויר טובה דו צדדית.
אין ירידה בתחושה בגפיים. במגבלת הכאבים, אין ירידה מוטורית.
בבדיקה רקטלית טונוס תקין .
צילום רנטגן מצורף.





מה השלב הבא ?

א- שחרור.

ב- CT אגן דחוף.

ג- אשפוז למעקב המוגלובין. .

ד- יעוץ אורתופדי בשאלה של ניתוח .

שאלה 69

בן 72 מתלונן על חולשה, הקאות ושלשולים.
בבדיקות מעבדה במלר"ד נמצא קראטינין 2.6, BUN 60 . FENa < 1%.
חודש טרם קבלתו היה מאושפז עם STEMI.
עבר צינטור עם STENT TO RCA.
במהלך האישפוז טופל ב GENTAMYCIN בשל UTI.
קראטינין באישפוז היה 1.2

מה הגורם לאי ספיקת כליות במטופל זה?
א- הגדלה שפירה של בלוטת הערמונית
ב- CONTRAST NEPHROPATHY
ג- טיפול ב GENTAMYCIN
ד- DEHYDRATION

שאלה 70

בת 80, בריאה. שוקלת 75 ק"ג.
עם פריקה של מפרק ירך, לאחר ניתוח HIP REPLACEMENT.
לצורך רדוקציה מקבלת PROPOFOL.

איזו תרופה יש להוסיף לצורך אנלגטיקה?
א IV KETAMINE 15 mg
ב IV KETAMINE 75mg
ג IV PARACETAMOL 1000 mcg
ד IV FENTANYL 500 mg

שאלה 71

מהם מאפיין מבנה אנטומי של דרכי האויר בילד (pediatric airway) ?

א- אפיגלוטיס קשיח.

ב- לרינקס גבוה ומיתרים קדמיים.

ג- סחוס קריקואיד מוגדל.

ד- אזור התירואיד הוא הצר ביותר.

שאלה 72

מהי הפרעת הקרישה השכיחה ביותר,

בנשים המגיעות למלר"ד עם תלונה של HEAVY MENSTRUAL BLEEDING?

א- HEMOPHILIA A

ב- HEMOPHILIA B

ג- VON WILLEBRAND SYNDROME

ד- FACTOR VII DEFICIENCY

שאלה 73



בן30 ברקע HIV.
לא נוטל תרופותיו. CD4 אחרון 100.
רגיש לפניצילין ולסולפה.
מתלונן על קוצר נשימה וחום מזה 3 ימים.
במעבדה WBC 4, LY 1.5
צילום חזה מצורף.
מה הטיפול?

א- CLINDAMYCIN ופרדניזון למשך 21 ימים
ב- RESPRIM (TMP-SMZ) למשך 21 ימים
ג- PRIMAQUINE+CLINDAMYCIN למשך 21 ימים
ד- פרדניזון למשך שבועיים, וחידוש טיפול אנטירטרוירלי.



שאלה 74

בן 65. מאבד הכרה במלר"ד.

במוניטור התמונה הבאה:

הטיפול בשלב הזה:

א- עיסויי לב במשך 2 דקות, DEFIBRILLATION, בדיקת מצב הכרה.

ב- עיסויי לב במשך 2 דקות, DEFIBRILLATION, בדיקת דופק.

ג- DEFIBRILLATION, בדיקת דופק, בדיקת מצב הכרה.

ד- DEFIBRILLATION, עיסויי לב במשך 2 דקות, בדיקת דופק.

שאלה 75

בן 79 לאחר נפילה. מתלונן על כאבים באגן. לא מסוגל ללכת בשל הכאבים.

בבדיקה: אגן יציב

ישנה רגישות באזור LT ASIS.

צילום אגן מצורף.

לחץ דם	דופק	סטורציה	חום
135/78	98	RA 96%	37.1



מה הפעולה הבאה?


א- צילום אגן OUTLET / INLET

ב- שיחרור עם טיפול בנרקוטיקה

ג- מיפוי עצמות בקהילה

ד- CT אגן ללא חומר ניגוד

שאלה 76



בן 73 , ברקע ATRIAL FIBRILLATION, .
מטופל ב DABIGATRAN .
מגיע בשל תלונות על קושי בנשימה ודופק מהיר.
בקבלתו בהכרה, מציג סימני מצוקה נשימתית
דופק רדיאלי חלש בשתי הידיים, קולות לב מרוחקים מאוד, ללא גודש ורידי צוואר. לאחר בולוס נוזלים.

לחץ דם	דופק	חום
60/30	102	38.5



מעבדה:
לויקוציטוזיס 17000
רמת טרופונין 34.5 (גבול תחתון-13)
תפקודי קרישה בגדר הנורמה

מהו הטיפול **המיידי**?

א. (PRAXBIND - IDARUCIZUMAB)
ב- אשפוז להשגחה וניטור בטיפול נמרץ לב.
ג- ניקור פריקרדיאלי.
ד- בולוס נוזלים ופרסורים.

שאלה 77

איזה מהמטופלים הבאים חשוד באי ספיקת כבד פולמיננטית?

א- אלכוהוליסט עם כאבים בבטן ימנית עליונה וטרנסאמניזות באלפים.
ב- מטופל עם צהבת מסוג B עליה בבילירובין מ 2 ל 6.
ג- חולה שחמת עם כאבים ב RUQ, והחמרה במיימת.
ד- חולה שחמת עם INR 2.5



שאלה 78

בן 50, לאחר תאונת דרכים.

בקבלתו ירידה בכניסת אויר משמאל.

צילום חזה מצורף:

מה האינדיקציה ל THORACOTOMY?

א- סטורציה 88% באויר חדר.



ב- ניקוז 1800cc דם לאחר הכנסת נקז חזה.

ג- ניקוז 1400cc דם בהכנסת נקז, ואז 100cc/hr דם במשך 4 שעות.

ד- צורך במתן 2 PC לצורך שמירה על לחץ דם 100/70.

שאלה 79

איזה מבין השברים הבאים, בעמוד שידרה צווארי,
נחשב לשבר לא יציב?

א-	ב-	ג-	ד-
			

שאלה 80

בן 67, ברקע: שחמת הכבד על רקע אלכוהול .
פונה למיון בשל הקאה דמית .
בזונדה דם טרי. מטופל בIV omeprazol

חום	סטורציה	דופק	לחץ דם
37.2	93%-RA	83	132/78

Cr	INR	PLT	HB
2.4 קודם 1.2	1.4	42000	9.6 קודם-13.5

מה השלב הבא בטיפול?


א- Blackemore tube

ב- מנת דם

ג- עירוי טסיות

ד- 2 מנות FFP

שאלה 81



בן 50, בריא בד"כ,
התמוטט ברחוב לאחר שחש בכאב בחזה.
הובא למלר"ד לאחר החייאת . VF
כעת מחוסר הכרה, מונשם.
בהאזנה – גודש ריאתי ניכר

לחץ דם	דופק	סטורציה
85/55	115	90%



מהו הצעד הטיפולי הבא?

א- MILRINONE
ב- EPINEPHRINE
ג- NOREPINEPHRINE +DOBUTAMINE
ד- PHENYLEPHRINE

שאלה 82


בן 7 משקלו ק"ג' 25
מגיע למלר"ד כ 45 דקות לאחר שבלע 300 מג' ברזל .
סימנים חיוניים תקינים והילד חיוני ומשחק.
מה מהבאים הוא קריטריון לשחרור מהמלר"ד?

א- רמות תקינות של TSIBC (total serum iron binding capacity) .
ב- הילד ללא סימפטומים 6 שעות לאחר הבליעה.
ג- ריכוז ברזל בסרום קטן מ 500 micrograms/dl.
ד- PH תקין בבדיקת גזים.

שאלה 83

בן 30, ברקע HIV. 3 ימים טרם קבלתו הופעת חום, קוצר נשימה, שיעול.

חום	סטורציה	דופק	לחץ דם	RR
38.3	92%	105	110/65	28



בדיקה : חרחורים עדינים בשני שדות הריאה.

מה מה רמת הCD4 המתאימה למצבו?

א- 190 תאים /ממ"ק

ב- 450 תאים/ממ"ק

ג- 320 תאים/ ממ"ק


ד- 830 תאים /ממ"ק

שאלה 84

בן 53, התקבל למלר"ד עקב פלפיטציות, חולשה בלבול כאבי ראש .

אק"ג מצורף:

מה ההפרעה האלקטרוליטרית הצפויה?



א- היפוקלמיה.

ב- היפרקלצמיה. .

ג- הרעלת טריצקלים.

ד- היפומגנזמיה.

שאלה 85

בן 19, פנה עקב כאבים בברך שהופיעו במהלך משחק כדורגל.
בבדיקתו לא מסוגל ליישר את הברך באופן פאסיבי או אקטיבי.

מה הסיבה **השכיחה ביותר** למצב זה?

א- קרע ב ANTERIOR CRUCUATE LIGAMENT

ב- קרע ב-POSTERIOR CRUCIATE LIGAMENT

ג- קרע במניסקוס

ד- שבר של הפיקה

שאלה 86

המטופלים הבאים עם לחץ דם 70/40, טכיפניאה, וסטורציה 89% באוויר חדר.

מהי התרופה האינוטרופית המתאימה?

	פרטים קליניים	INOTROPIC DRUG OF CHOICE
א-	בן 48. ברקע HOCM	DOBOTAMINE
ב-	בת 80, באקג VT	PHENYLEPHRINE
ג-	בת 21 עם SHOCK SYNDROME TOXIC	VASOPRESSINE
ד-	בן 59, הקאה דמית, ודם טרי בצואה	NOREPINEPHRINE

שאלה 87

בת 70 ברקע דיכאון, נוטלת Brotizolam וטיפול נוגד דכאון באופן קבוע.
מעורפלת הכרה. נמצאו חפיסות ריקות ליד מיטתה.
בקבלתה:

לחץ דם	דופק	Sat
120/60	110	95% RA

בבדיקתה -

פתיחת עיינים	תנועות גפיים	דיבור	אישונים
לכאב	ממקמת כאב	מילים בודדות	5 מ"מ, שווים, מגיבים לאור

לאחר מתן Flumazenil הופיע פרכוס. טופלה בIV DIAZEPAM 10 mg, בהמשך פירכוס חוזר ממושך.

מה המשך הטיפול?

א- יש לבצע CT ראש לפני מתן טיפול תרופתי כלשהו.

ב- מנה נוספת של IV DIAZEPAM.

ג- IV PHENYTOIN.

ד- IV PHENOBARBITAL.

שאלה 88

בן 26, ננשך על ידי כלב שברח, בטיול ברמת הגולן.

מה הטיפול המונע לכלבת?

א- חיסון סביל (HRIG) לאיזור הנשיכה, וחיסון פעיל ב GLUTEUS
ב- חיסון סביל (HRIG) לאיזור הנשיכה, וחיסון פעיל ב DELTOID
ג- חיסון סביל (HRIG) ב GLUTEUS, וחיסון פעיל באיזור הנשיכה.
ד- חיסון סביל (HRIG) ב DELTOID, וחיסון פעיל באיזור הנשיכה.

שאלה 89

בן 50. התמוטט ברחוב. צוות מד"א מצא אותו עם VF .

החל החייאה עם עיסויים בעזרת מכשיר AUTOMATIC CHEST COMPRESSOR.

היו 8 ניסיונות BIPHASIC DEFIBRILLATION SHOCK,

קיבל EPINEPHRINE, AMYODARONE, LIDOCAINE.

בקבלתו במוניטור VF. ETCO2 34

מה הטיפול?

א- DRIP EPINEPHRINE

ב- OVERDRIVE PACING

ג- מתן DEFIBRILLATION עם שני מכשירים


ד- IV PROPAFENONE

שאלה 90


בן 50, מגיע עקב כאבים בחזה.

איזה תרשים אק"ג יצדיק הפניה לצינטור דחוף?


א




ב




ג




ד





3x4 1R
I
aVR
V1
V4
II
aVL
V2
V5
III
aVF
V3
V6
II

א

90



I
aVR
V1
V4
II
aVL
V2
V5
III
aVF
V3
V6
II

ב


I
aVR
V1
V4
II
aVL
V2
V5
III
aVF
V3
V6
II

ג

90


Name:
ID:
Patient ID:
Incident ID:
Age: 37
Sex:
12-Lead 1
PR 0.172s
QT/QTc:
P-QRS-T Axes:
HR 86bpm
09:29:36
QRS 0.188s
0.406s/0.485s
53° -56° 96°
• Abnormal ECG **Unconfirmed**
• Normal sinus rhythm
• Left axis deviation
• Left bundle branch block
I
aVR
V1
V4
II
aVL
V2
V5
III
aVF
V3
V6
x1.0 .05-40Hz 25mm/sec
ECGMedicalTraining.com
@ECGTraining

ד

שאלה 91


בת 82, ברקע AORTIC STENOSIS

ללא סימפטומים. ללא טיפול תרופתי קבוע.

הגיעה למלר"ד בשל סינקופה שלווה בכאבים בחזה .

בקבלתה:

לחץ דם	דופק	סטורציה
150/70	110	97%



מה הצעד הבא?

א- אישפוז עם טיפול לתעוקה לא יציבה.

ב- אשפוז להערכה של המסתם האאורטלי.

ג- שיחרור לביצוע הולטר קצב ואקו בקהילה.

ד- שיחרור עם טיפול ב VERAPAMIL.

שאלה 92

צעיר הגיע באי שקט לאחר שלקח אמפתמין.


מדדים בקבלתו-

דופק	לחץ דם	sat	חום
110	190/100	98%	37.4

לאחר מתן הלידול

מתלונן על פלפיטציות וחולשה

מצורף אקג



מה הטיפול המידי?


א- IV MAGNESIUM 2gr

ב- IV PHENTOLAMINE 5mg

ג- IV VERAPAMIL 5mg

ד- IV SODIUM BICARBONATE 1mEq/L

שאלה 93



	בנוזל הפלאורלי
pH	7.15
LDH	1200 IU/L
GLUC	70 mg/dL
WBC	6,000

בן 75 ברקע סוכרת.

לפניי שבועיים סבל ממחלת חום ושיעול

טופל באנטיביוטיקה בקהילה.

פנה למלר"ד בשל כאבים בבית חזה ימני.

בצילום חזה נמצא נוזל פלאורלי.

בדיקת הנוזל מצורפת:

מה הטיפול?

א- IV TAZOCIN

ב- נקז חזה

ג- נקז חזה, IV TAZOCIN

ד- PO AUGMENTIN

שאלה 94

בן 45 מתלונן על שלשול דמי מזה מס' ימים.
יש כאבים בפי הטבעת (anus) מזה 3 חודשים, כעת בהחמרה.
מטופל באמבטיות חמות ומרככי צואה.
בבדיקת PR: לראה הממצא הבא.
צואה ללא דם טרי.



מה המשך הטיפול?


א- משחת לידוקאין והפניה לקולונוסקופיה.
ב- טיפול מקומי במשחת הידרוקורטיזון והפניה לניתוח.
ג- הפסקת טיפול במרככי צואה, והפניה לפרוקטולוג בקהילה.
ד- תרביות צואה, וטיפול אנטיביוטי בהתאם.

שאלה 95

מטופל פנה בשל הופעת הבזקי אור בעינו הימנית.

בהמשך ירידה בחדות ראייה במרכז שדה הראייה.

מה תמונת האולטרה סאונד שמסבירה את התסמינים?

א	ב	ג	ד
			

שאלה 96

בת 45 שבוע 22 להריונה הראשון.
פונה בשל הקאות מזה 3 ימים
בקבלתה נימדדת רמת דקסטרוז 020, קריאטינין מוגבר.
קטונים בשתן .

BIC	PH
19	7.2

מה הגורם שיסביר את מצבה ?

א- type II DM
ב- אי ספיקה כלייתית.
ג- טיפול תרופתי.
ד- הריון.

שאלה 97

בת 50 עם דיכאון מטופלת בCipramil. לפני שבוע החלה Risperidone.

הובאה עקב ירידה במצב ההכרה.

בבדיקתה:

דופק	לחץ דם	חום
110	90/60	40°C

דופק סדיר ומהיר. כניסת אויר טובה דו צדדית. הבטן רכה.

בבדיקה נוירולוגית: נאנחת. פוקחת עיניים לכאב בלבד.

אישונים שווים ומגיבים לאור. נסוגה לגירוי כאב.

ישנה נוקשות כללית בגפיים, ללא קלונוס.

בשל הקאה הוחלט על אינטובציה.

מה התרופות לRSI במטופלת זו

א- Midazolam+ Succinylcholine

ב- Etomidate +Rocuronium

ג- Ketamine + Rocuronium

ד- Propofol + Succinylcholine

שאלה 98

בת 55, ברקע סכרת. מזה יומים חום וכאב ראש.


מגיעה בשל בלבול.

בקבלתה:

חום	לחץ דם	דופק	סטורציה
39.3	127/66	115	100%

שקועה, שיתוף פעולה חלקי.

קשיון עורף. פריחה כמתואר בתמונה:



מה סדר הפעולות הנכון?

א- אנטיביוטיקה, ניקור מותני.

ב- סטרואידים, ניקור מותני, אנטיביוטיקה.

ג- סטרואידים, אנטיביוטיקה, ניקור מותני.


ד- ניקור מותני טיפול על פי תוצאות.

שאלה 99

בן 52. בריא.מתלונן על כאבים בבטן עליונה מזה יומיים. ללא כאב בחזה.
מתאר ירידה במשקל בחודש האחרון, והשתנה מרובה, ללא צריבה בשתן.
בקבלתו:

לחץ דם	דופק	סטורציה	חום
153/93	110	98%	37.1

בדיקת גלוקוז סטיק 380mg%
הבטן רכה, ישנה רגישות אפיגסטרית ללא סימני גירוי צפקי.
בעת לקיחת דמים נראה המראה הבא (בתמונה).
בבדיקת כמיה LIPASE 3200.



מה הבדיקה הבאה שיש לבצע?

א- HB A1C

ב- פרופיל שומנים

ג- US בטן לכבד ודרכי מרה

ד- CT בטן עם חומר ניגוד IV

שאלה 100

בת 26. מתלוננת על חולשה קיצונית, בחילות וחוסר תיאבון.

ירדה 8 ק"ג משך 3 חודשים. בברור בקופת חולים נמצא TSH 6.

החלה טיפול באלטרוקסין.

חום	דופק	לחץ דם עמידה	לחץ דם שכיבה
36.9	90	70/40	100/60

סימנים בקבלתה:

CACHEXIA. דופק סדיר, ריאות: כניסת אויר טובה דו צדדית. הבטן לא רגישה.

מראה הפנים והידיים בתמונות.



בבדיקות מעבדה:

Na	K	Creat	Glug
124	5.4	0.5	76

מה האבחנה הסבירה?

א- HYPOTHYROIDISM

ב- ADDISON'S DISEASE

ג- ANOREXIA NERVOSA

ד- SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS

שאלה 101

בן 75 ברקע יל"ד סכרת ,

מטופל באינסולין, גלוקומין ו -TRITRACE COMP (טריטייס + תיאזיד).

פונה למלר"ד עקב נפיחות וכאב עז באצבע. תמונה מצורפת:



במעבדה URIC ACID תקין, CRP -20

מה ההסבר לתופעה, ומה הטיפול?

א- מדובר בשקיעה של גבישי סידן יש להוריד צריכת בשר אדום.

ב- מדובר בשקיעה של גבישי אורט. יש להחליף טיפול תרופתי ליתר לחץ דם.

ג- מדובר בשקיעת גבישי סידן יש להוסיף טיפול באלופורינול.

ד- מדובר בשקיעת גבישי אורט יש להתחיל טיפול באספירין.

שאלה 102

בן 70, ברקע Ch AF, מטופל ב BISOPROLOL, ELIQUIS.

RR	סטורציה	דופק	לחץ דם
28	88%	150	110/65

פנה עקב פלפטציות וקוצר נשימה.


בקבלתו: בהכרה מלאה.

בהאזנה לריאות חירחורים מפושטים.

קולות לב לא סדירים ומהירים.

מצורפים תמונת מוניטור ותמונה מתוך אקו





מה הטיפול?

א- CARDIOVERSION

ב- DEFIBRILLATION

ג- IV METOPROLOL

ד- IV VERAPAMIL

שאלה 103

איזה מהפגיעות בברך עלולה לגרום לפגיעה ב POPLITEAL ARTERY?

א- שבר עם פריקה של TIBIAL PLATEAU

ב- שבר רוחבי של ה PATELLA.

ג- פגיעה בANT CRUCIATE LIGAMENT

ד- שבר MAISONNEUVE

שאלה 104

בן 45 אובחן כסובל מפנקראטיטיס.

מה מהממצאים הבאים יצביע על חומרת מחלתו?

א- תפליט פלאורלי.

ב- המוגלובין -11.

ג- אבנים בכיס מרה.

ד- רמת ליפז פי 3 מהנורמה.

שאלה 105

בן 63. בספירת דם שבוצעה במלר"ד, בשל חבלה בצוואר ירך,
נמצא: Hb 19, WBC 9, NEUT 60%, PLT 470,000
מה מהסימנים או הסימפטומים הבאים
ירמז על אבחנה POLYCYTHEMIA VERA?

א- גרד לאחר מקלחת חמה
ב- עישון כבד
ג- HEPATOMEGALY
ד- LYMPHADENOPATHY

שאלה 106

בן 4 הובא 3 שעות לאחר בליעת בטריית כפתור.

נינוח סימנים חיוניים תקינים ,בטן רכה.

צילום בטן מצורף.



מה הטיפול הנכון?

א– הזמנת אנדוסקופיה דחופה.

ב– הוצאת הבטריה בעזרת קטטר פולי.

ג– שחרור עם צילום בטן שבועי .

ד– לפרוטומיה דחופה.

שאלה 107


בן 28 מגיע עם מד"א לאחר פיצוץ במפעל גז,
בבדיקה קרע בעור התוף דו"צ,
עדות לLUNG CONTUSION בצילום חזה,

באיזה סוג של BLAST INJURY מדובר?

א- PRIMARY.
ב- SECONDARY.
ג- TERTIARY.
ד- QUATERNARY.

שאלה 108

בן 15 מתלונן על חום, שיעול, הפרשות בעיניים ופריחה בתוך הפה נראה הממצא בתמונה.



אילו ממצאים נוספים, באנמנזה ובבדיקה ,
צפויים להמצא אצל המטופל?

א- פריחה מקולופפולרית שהתחילה בראש והתפשטה כלפי מטה
ב- היפרדות האפידרמיס בזמן לחיצה על העור
ג- לשון בגוון אדום וגלדים של עור במפשעות ובתי השחי
ד- פטכיות בגוף ובגפיים התחתונות, עם מעורבות רירית הפה

שאלה 109 .

מבקשת מקלט ממרכז אפריקה

מתלוננת על קוצר נשימה ,שיעול דמי ,וירידה במשקל.

בקבלתה:

חום	דופק	לחץ דם	סטורציה	נשימות לדקה
37.8	111	95/65	92% באויר חדר	24

צילום חזה מצורף

מה הצעד הבא?

א-אישפוז לטיפול אנטיביוטי ב IV LEVOFLOXACIN.האשפוז בחדר רגיל ,ללא אמצעי בידוד

ב-אישפוז לברור TB בידוד בחדר עם לחץ שלילי .מסכה כירורגית למטופלת ,


ומסכת N 95 למלווים ולצוות המטפל

ג-אישפוז לברור TB-, התחלת טיפול אנטיביוטי לאחר לקיחת תרביות ליחה וצביעת Ziehl-Neelsen .בידוד בחדר עם לחץ חיובי ,מסכת N 95 למטופלת ,למלווים ולצוות המטפל .

ד-המתנה לסיום הברור במלר"ד ,בחדר בידוד עם לחץ שלילי,

שיחרור להמשך ברור במרפאת ריאות בקהילה .הנחיה ללכת עם מסכת 95 N

שאלה 109





שאלה 110

בן 40, לפני שבועיים סבל מדלקת בגרון. קיבל טיפול ב PENICILLIN.

לפני שבוע התחיל חום, כאבי שרירים

פנה עם חום ושינויים בעור כפי שנראה בצילום:



מה מהתופעות הבאות יחזק את האבחנה?

א- הופעת בועות בשיפשוף קל של העור (סימן ע"ש NIKOLSKY)

ב- נקודות לבנות בפה (ע"ש KOPLICK)

ג- אאוזינפיליה בספירת דם מעל 5%

ד- מערבות של כפות רגליים

שאלה 111

בת 68 ברקע אסטמה מטופל במרחיבי סימפונות.

חצי שעה לאחר אכילה במסעדה החלה להתלונן על בחילה, עוויתות בבטן, סחרחורת וקוצר נשימה.

במלר"ד בהכרה מעורפלת, לחצי דם 86\57, אודם בפנים. בהאזנה לריאות לא נשמעת כניסת אוויר דו"צ.

לאחר מתן 3 זריקות אדרנלין לירך, ללא שיפור בתסמינים.

מה השלב הבא בטיפול?

א- לבצע GASTRIC LAVAGE

ב- מתן גלוקגון GLUCAGON

ג- הזרקת IM ADRENALIN לשריר הדלטואיד.

ד- מתן IV ADRENALIN.

שאלה 112

בן שמונה חודשים, בריא, נפל מעגלת ילדים ונחבל בראשו.

מראה החבלה בתמונה.

שכב ללא תגובה על הריצפה במשך 2-3 שניות, ואז פרץ בבכי.

הקיא פעם אחת.

בבדיקתו במלר"ד: עיניים פקוחות, בוכה.

על הידיים של אימו באי שקט, לא משתף פעולה בבדיקה. מניע 4 גפיים.

לא נמוש קו שבר. ללא חבלות אחרות.



מה הצעד הבא על פי PECAN RULES?

א- ביצוע CT מח דחוף.

ב- אישפוז להערכה של CHILD ABUSE.

ג- אישפוז להשגחה ללא CT מח.

ד- שיחרור עם הדרכת ההורים.

שאלה 113

בן 3 הכניס גוף זר לאפו כשעה טרם קבלתו.
הילד נינוח, ללא מצוקה נשימתית.
מצורף צילום.



מה השלב הבא ?

א- הוצאה בעזרת מלקחיים.

ב- נשיפה לתוך פה המטופל תוך סתימת נחיר ימין

ג- צילום אף.

ד- סדציה לשליפה של הגוף הזר.

שאלה 114



בן 40, לאחר דקירת סכין בגלוטאוס מימין
סימנים חיוניים תקינים.
מיקום החתך בתמונה
נצפה דימום שפסק לאחר לחץ מקומי.
בדיקה רקטלית ללא עדות לדם טרי.
סטיק שתן 3+ RBC.

מה הצעד הבא?
א- SIGMOIDOSCOPY באישפוז
ב- WOUND EXPLORATION.
ג- CT ANGIOGRAPHY + CYSTOGRAPHY.
ד- LAPAROYOMY

שאלה 115

בספירת הדם המצורפת ,שנלקחה בגלל חולשה, האבחנה המתאימה היא:

א- IRON DEFICIENCY

ב- B12 DEFICIENCY

ג- HYPOTHYROIDISEM

ד- THALASSEMIA MINOR

		ערכי ייחוס
HBG	8.7	11.7-15.7
RBC	3.1	3.8-5.2
MCV	60	81-95
RDW	13.1	12-14.7
WBC	9	4-11
NEUT%	67%	50-70%
PLT	380	140-450

שאלה 116

בת 6 שנים לאחר תאונת דרכים חזיתית.

הייתה חגורה במושב אחורי ברכב. מתלוננת על כאב בטן.

בקבלתה:

בהכרה מלאה, ללא סימני חבלה בראש, ללא חסר נוירולוגי.

ללא קיפוח) NO COMPROMISEדרכי אויר. כניסת אויר טובה דו"צ.


מראה הבטן בתמונה. יש רגישות דיפוזית.

ללא חבלה משמעותית בגפיים.

CTבטן בפרוטוקול טראומה, כולל ציסטוגרפיה, ללא ממצא חבלתי

בהמשך החמרה בכאבי בטן הופעת הקאות.

על פי הנתונים, איזו פגיעה לא ניתן לשלול?



א- דיסקציה טראומטית של ABDOMINAL AORTA

ב- קרע בטחול.

ג- קרע בכבד.

ד- קרע במעי הדק.

שאלה 117

בן שנה וחצי.

נבדק במלר"ד בשל חום גבוה 38.5, ואי שקט.

בבדיקה: נראה כאוב. בוכה.

בבדיקת האוזניים המראה הבא:



מה הטיפול?

א- TYMPANOSTOMY תחת סדציה.

ב- אישפוז לטיפול אנטיביוטי IV.

ג- שיחרור עם אנטיביוטיקה PO.

ד- טיפול בנוגדי כאבים וחום.

שאלה 118

בן 56 פנה בשל אובדן ראיה חד בעיין ימין מזה שעתיים.
ברקע יל"ד מטופל ברמיפריל ואספירין.
לחץ תוך עיני תקין ,בדיקת תגובה לאור מצורפת.



מה הפגיעה העצבית?

א- Rt optic tract

ב- Rt optic nerve

ג- Rt optic radiation

ד- Optic chiasma

שאלה 119

בן 80. ברקע: יתר לחץ דם. פונה בשל כאבים בבטן עליונה מזה יומיים.

לחץ דם	דופק	סטורציה	חום
133/86	80	98%	36.5

ללא חום. ללא שינוי בפעולות מעיים.

בבדיקתו: הבטן רכה,

ישנה רגישות ב RUQ, סימן MURPHY חיובי.



בבדיקות דם WBC 20 NEUT 90%

תפקודי כבד וליפאז תקינים.

מצורפת תמונה מ CT עם הזרקת חומר ניגוד.

מה הטיפול?

א- נוגדי כאבים ושיחרור, תור אמבולטורי ל CHOLECYSTECTMY

ב- נוגדי כאבים, אנטיביוטיקה, ו CHOLECYSTECTMY דחוף

ג- זונדה, נוזלים ואישפוז להשגחה

ד- נוגדי כאבים ושיחרור לביצוע COLONOSCOPY

שאלה 120

בת 29, בריאה, ללא טיפול תרופתי, בהריון שבוע 9.

מתלוננת על כאב ראש עז מהבוקר.

דופק	לחץ דם	סטורציה	חום
110	100/70	99%	36.3

סימנים חיוניים בקבלתה:


זמן קצר לאחר קבלתה נצפה פרכוס כללי, לראשונה בחייה.

GLUC	HB	PLT	CREAT
101mg%	7.8	12,000	1.7

בבדיקה לאחר סיום הפרכוס, פלגיה משמאל.

בבדיקות דם, אין הפרעות אלקטרוליטריות.

מצורף חתך מייצג מ CT ראש שבוצע.



מה הבדיקה שתאשר את האבחנה?

א- CTA של המח

ב- LP עם מדידת לחץ ואנליזה של CSF

ג- משטח דם

ד- CT חזה, בטן ואגן

שאלה 121

בן 63, פונה בשל חולשה. בקבלתו שקוע. מתנשם:

לחץ דם	דופק	סטורציה	חום
70/40	108	82% אויר חדר	39.3

המטופל מחובר לחמצן. מוכנס עירוי 20G, ונלקחות בדיקות דם.

בבדיקתו, לאחר ביצוע PASSIVE LEG RISE נמדד לחץ דם 90/60

מה הפעולה הבאה?

א- השכבה של המטופל בתנוחת TRANDELENBURG

ב- התחלה מיידית של NOREPINEPHRINE DRIP

ג- הכנסת עירוי נוסף 18G, והזלפה של 0.9% 2 L SALINE

ד- RSI, וחיבור למכונת הנשמה

שאלה 122

בן 5 חודשים התקבל לאחר אירוע של פירכוס וחום.
במחלקה אירוע נוסף של פירכוס טוני קלוני נמשך כ2 דקות .
בבדיקה מעט ישנוני , בדיקה גופנית תקינה חום 37.8.
מה האבחנה, ומה המשך הברור?

א- פרכוס חום פשוט. יש צורך בבדיקות דם וניקור מותני.

ב- פרכוס חום מורכב יש צורך באשפוז.

ג- פרכוס חום מורכב ניתן לשחרר למעקב בקהילה.

ד- פרכוס חום פשוט ניתן לשחרר למעקב בקהילה.

שאלה 123

בן 14, בריא בדרך כלל. מתלונן על כאבים במפשעה שמאל מאתמול.
הופיעו לאחר משחק כדורגל. ללא חבלה משמעותית.
בבדיקה: הולך עם צליעה קלה. אין שטף דם או נפיחות באזור.
טווח תנועה במפרק ירך שמאל מוגבל בשל הכאבים
אשכים ללא ממצא.
צילום אגן מצורף



מה הטיפול?

א- נוגדי דלקת לפי צורך, מנוחה, חזרה הדרגתית לפעילות ספורטיבית.
ב- דריכה לפי יכולת, נוגדי דלקת לפי צורך, ביקורת אורתופד תוך שבוע .
ג- דריכה לפי יכולת, נוגדי דלקת לפי צורך, ביצוע MRI בקהילה.
ד- לא לשאת משקל, ביקורת אורתופד בשאלת ניתוח.

שאלה 124

מי מהפצועים הבאים לא זקוק לצווארון קשיח בזמן העברה לבית החולים?

א- בן 70 נהג, היה חגור, מנגנון תאונה אחורי, ללא כאבים בצוואר


ב- בת 50, נהגת, הייתה חגורה, תאונה חזיתית, כאבים עזים ודפורמציה בירך

ג- בן 30, נהג, היה חגור, מנגנון תאונה אחורי, אי נוחות בצוואר

ד- בן 12, נוסע, היה חגור, מנגנון תאונה צידי, ללא כאבים

שאלה 125

להלן בדיקת לוע של מטופלת לקראת סדציה.



מהי דרגת MALLAMPATI של המטופלת?

א- MALLAMPATI I

ב- MALLAMPATI II

ג- MALLAMPATI III

ד- MALLAMPATI VI

שאלה 126


בן 4 היה מעורב בתאונת דרכים . היה חגור בכיסא תיקני.
טרם הגעת צוות רפואי התלונן על כאבי בצוואר.
במהלך הפינוי בשל אי שקט טופל במידזולם תוך אפי
Intranasal midazlom .
בקבלתו מדדים חיוניים תקינים, GCS-13, ללא ממצא חבלתי.

מה השלב הבא בטיפול?

א- CT ראש צוואר.
ב- צילום עמוד שידרה צווארי והשגחה.
ג- יעוץ אורטופדי.
ד- שיחרור ללא צורך בהמשך ברור.

שאלה 127

איזה מתרשימי הקפנוגרף (End tidal CO2) תואם את הסיפור הקליני?



א- חולה בהתקף אסתמה קשה

ב- מטופל עם הרעלת OPIATS

ג- מטופל בסדציה

ד- DKA

שאלה 128

בת 48 מושתלת כליה מזה שנה.
זקוקה לעירוי דם במלר"ד.

איזו מנת דם מתאימה למטופלת?

א- מוקרן.
ב- שטוף.
ג- עם פילטר.
ד- רגיל עם סטרואידים.


שאלה 129

בן 86 לא הטיל שתן ב24 שעות אחרונות .
לאחר הכנסת קטטר שתן נמדדה שארית של 1000 מ"ל .
בסטיק שתן: WBC +2, RBC +1, NIT NEGATIVE
קראטינין תקין.
ארבע שעות לאחר הכנסת הקטטר בשקית 250 מ"ל.

מה המשך ההטיפול?

א- אישפוז לטיפול אנטיביוטי
ב- אישפוז עם טיפול בנוזלים ו alfuzosin
ג- הוצאת הקטטר, ושיחרור עם טיפול ב alfuzosin
ד- שיחרור עם טיפול ב alfuzosin למעקב מרפאתי


שאלה 130



בן 55 ברקע סוכרת, יל"ד, עישון .
פנה עקב קוצר נשימה פתאומי.
מציין כאבים בחזה מזה 3 ימים.
בקבלתו מזיע, מתנשם.

לחץ דם	דופק	סטורציה
82/45	88	89%

ב POCUS, אין תפליט פריקרדיאלי.
אק"ג וצילום חזה מצורפים:



מה האבחנה הסבירה?

א- VENTRICULAR FREE WALL RUPTURE
ב- PAPILLARY MUSCLE RUPTURE
ג- INTERVENTRICULAR RUPTURE
ד- DISSECTION OF THE ASCENDING AORTA

שאלה 131

בן 62 התקבל לאחר חבלת ראש GCS-10 .
מצורפת תמונת CT ראש.
מה המדדים הרצויים למטופל?



א- יעד של לחץ דם דיאסטולי מעל 80 ממ"כ.
ב- יעד של ממ"כ 65 -MAP.
ג- יעד של לחץ דם סיסטולי 90 ממ"כ.
ד- יעד של ממ"כ 80 -MAP ומעלה.

שאלה 132

מהי הסיבה השכיחה ביותר למות עובר בטראומה של אישה בהריון?

א- לידה מוקדמת.

ב- קרע של הרחם.

ג- הפרדות שליה.

ד- מוות של האמא.



שאלה 133

בן 50, תחת השפעה של אלכוהול, נפילה וחבלת כתף ימין.

בבדיקתו – ללא חסר עצבי או וסקולרי ביד הפגועה.

צילום רנטגן מצורף:


מה הטיפול?

א- שחרור עם מתלה כתף

ב- סדציה והחזרת פריקה מיידית

ג- סדציה והחזרת פריקה לאחר שתחלוף השפעת האלכוהול.

ד- אשפוז לניתוח.



שאלה 134

מה הסיבה השכיחה ביותר לדימום LOWER GI במבוגרים?

א- DIVERTICULOSIS

ב- EXTERNAL HEMORRHOIDS

ג- COLON POLYP

ד- UPPER GI BLEEDING

שאלה 135


מה מהבאים מגדיר מטופל עם PE בדרגת סיכון גבוהה?

א- B-type natriuretic peptide-40 picograms/mL

ב- Shock index -0.7

ג- D-dimer-3200 nanogram/ml

ד- Sat-93%



שאלה 136

בן 64. ברקע יל"ד.
מתלונן על כאב דוקר בחזה.
הופיע במנוחה 4 שעות טרם קבלתו.
ללא אירועים דומים בעברו, במאמץ או במנוחה.
בקבלתו ללא כאבים.
בקבלתו:

לחץ דם	דופק	סטורציה
164/90	80	97%

אק"ג מצורף.
בדיקת טרופונין HIGHLY SENSITIVE שלוש שעות לאחר קבלתו, שלילית.

מהו הפעולה הבאה?

א-אשפוז לביצוע ECHOCARDIOGRAPHY.
ב-אשפוז לביצוע CT CORONARY ANGIORAPHY.
ג-שחרור לביצוע ECG-BASED EXERCISE TESTING אמבולטורי.
ד-שחרור לביצוע PHARMACOLOGIC IMAGING STUDY אמבולטורי.

שאלה 137


SAT	דופק	RR	לחץ דם
99% RA	100	14	140/84

בן 37. תייר.
מתלונן על כאבי בטן ועצירות.
בבדיקתו: נינוח וללא תלונות.
הבטן רכה. רגישות ב RLQ, ללא סימני גירוי צפקי.
בבדיקות דם CRP 20, WBC 12
מצורף חתך מ CTשבוצע:



מה הטיפול?
א- לפרוטומיה
ב- קולונוסקופיה
ג- שיחרור למעקב גסטרו
ד- *WBI-whole bowel irrigation*

שאלה 138



בן 70. ברקע COPD . מאובחן עם פנאומוניה.

הונשם בשל קוצר נשימה.

סימנים חיוניים ומדדי הנשמה מצורפים.

TV	PEEP	FIO2	RR
500	8	1.0	14

ETCO2	לחץ דם	דופק	סטורציה	חום
39	98/62	105	88%	38

מה הפעולות שיש לבצע לשיפור החמצון ?

א- מעקב auto PEEP , ירידה ב מס' נשימות(RR) , שיתוק המטפל.

ב- מעקב plateau pressure , עלייה בPEEP , ירידה בנפח הנשמה (TV)

ג- מעקב peek insipiratory pressure , עלייה בPEEP, מתן furosemide

ד- מעקב pressure waveform , הגדלת I:E ratio , מתן salbutamol

שאלה 139

בת 87. ברקע: MDS, מחלת לב איסכמית.

פונה בשל הקאות דמיות.

בקבלתה:

דופק	ל״ד	SaO2
89	100/56	94%

במעבדה:

60000, PLT 7.2, HB 1.1INR

מהו הטיפול, לפני ביצוע גסטרוסקופיה?

(PC=PACKED CELLS, PLT=PLATELETES)

א- PC, PPI, ERYTHROMYCIN, PRAMIN

ב- PC ,OCTREOTIDE, PPI, ERYTHROMYCIN, PRAMIN

ג- PPI, OCTREOTIDE, ROCEFIN, PRAMIN

ד- PC, PLT, PPI, ERYTHROMYCIN, PRAMIN

שאלה 140

בת 24, פונה בשל כאבי בטן עליונה.

בבדיקתה: ללא חום. ישנה רגישות בבטן ימנית עליונה.

בעת ביצוע POCUD, כפי שנראה בסרטון,

המטופלת מתלוננת על כאב באיזור ה TRANSDUCER.

בבדיקות דם WBC 14 NEUT 89%

שאר הבדיקות בגדר הנורמה.



מה האבחנה?

א- BILIARY COLIC

ב- CHOLECYSTITIS

ג- CHOLANGITIS


ד- אין מספיק נתונים

שאלה 141

בן 70, ברקע של COPD, מעשן, דלקת פרקים, מטופל בפרדניזון.

ללא אשפוזים לאחרונה. מתקבל עם חום 38.5 מזה כיומיים,
צמרמורות, כאב ראש, שיעול יבש, קוצר נשימה, שלשולים והקאות.

מטוש ל COVID 19 שלילי מאתמול ומלפני יומיים.



מה הבדיקה המהירה ביותר לאבחון הפתוגן ?

א- שתן.

ב- כיח .

ג- צואה .

ד- דם.

שאלה 142

צעיר מפונה למלר"ד לאחר תאונת דרכים במנגנון קשה.




איבד הכרה בדרך לבית החולים.

בקבלתו, כ- 20 דקות לאחר מכן, מחוסר הכרה.

ללא דופק וללא נשימה.

תמונת המוניטור ו FAST בקבלתו מצורפת.





מה הפעולה המיידית?

א- קביעת מוות.

ב- FINGER THORACOSTOMY.

ג- OPEN THORACOTOMY.

ד- CHEST COMPRESSIONS.

שאלה 143



בן 25 לאחר נפילה על יד ימין .
מתקשה ביישור היד

Modified Thompson test פתולוגי.
צילום המרפק מצורף.

מה האבחנה ?

א- AXILLARY NERVE TEAR
ב- BICEPES TENDON RUPTURE
ג- AVALSION EPICONDILAR FRACTURE
ד- TRICEPS TENDON RUPTURE

שאלה 144

בן 58, מתלונן על כאבים בבטן תחתונה מזה 3 ימים. ללא חום.

ללא שילשול או עצירות. ללא צריבה במתן שתן.

בבדיקה: ללא סימני קיפוח המודינמי.

רגישות ממוקמת בבטן תחתונה, באיזור UPRAPUBIC

במעבדה ,WBC 12 NEUT 85% CRP 20 (תקין 0-5)



בוצע CT בטן עם חומר ניגוד IV. להלן תמונות נבחרו

(התמונות בהגדלה בשקופות הבאה).



מה הטיפול?

א. לפרוטומיה

ב. CT GUIDED DRAINAGE

ג. IV CEFTRIAXONE + IV METRONIDAZOLE

ד. PO AUGMANTIN

שאלה 144





שאלה 145





בן 20, בריא, נחבל בפנים במהלך קטטה.
צילום ומראה האף מצורפים.
מה הפעולה הבאה?

א- שחרור עם נוגדי כאבים,
ביקורת אא"ג אחרי שבועיים

ב- שחרור עם PO AUGMENTIN לשבוע,
ביקורת אא"ג אחרי שבוע

ג- ניקוז במלר"ד, טמפונדה, אנטיביוטיקה מקומית,
ביקורת אא"ג אחרי יממה

ד- אשפוז למחלקת אא"ג לניתוח דחוף

שאלה 146

בן 71, ברקע squamous cell carcinoma of the neck.

פנה בשל אירוע של SYNCOPE בזמן גילוח, ללא נפילה או חבלת ראש. במיון יציב, אירועים דומים בעבר, פעם בזמן נהיגה ועוד פעם במהלך שחייה.

עבר בירור קרדיאלי מקיף כולל אקו לב, הולטר אק"ג וצנתור לבבי, שהיו תקינים.

מתמצא, בדיקה נוירולוגית תקינה, אק"ג סינוס, סדיר.

מה מהבאים מסביר את מנגנון הסינקופה בחולה?

א-VASOVAGAL SYNCOPE

ב-REFLEX MEDIATED SYNCOPE

ג-ACUTE DYSRYTHMIA

ד- SITUATIONAL SYNCOPE

שאלה 147

בן 62 התקבל בשל חום 3 ימים , כאבים בבטן ימנית עליונה .מציין הקאות בלתי פוסקות ביומיים האחרונים.

בבדיקה סימן ע"ש מרפי חיובי.

חום	לחץ דם	RR	דופק	SAT
39.5	86/56	19	125	94%

אילו ממצאים מעבדתיים מתאימים למצבו של המטופל?

א	ב	ג	ד
PH – 7.42 pCO2- 29 $Hco3^-$- 19 Na- 140 K – 4 Cl- 110	PH – 7.25 pCO2- 27 $Hco3^-$- 12 Na- 140 K – 4 Cl- 95	PH – 7.34 pCO2- 60 $Hco3^-$- 30 Na- 140 K – 4 Cl- 100	PH – 7.15 pCO2- 40 $Hco3^-$- 15 Na- 140 K – 4 Cl- 98

שאלה 148

מה מהממצאים הבאים מאפיין COMPARTMENT SYNDROME בשלבים מוקדמים?

א- הגפה חיוורת וקרה.

ב- לא ניתן למשש דפקים.

ג- כאב עז למרות טיפול באופיאטיים.

ד- שיתוק מוטורי לפני חסר תחושתי.

שאלה 149

באירוע שריפה אותרו 4 נפגעים
במרכז כוויות 3 מקומות.
את מי ניתן לפנות לבית החולים האזורי ?

א- בן 15 כויות בגב עליון חבלה ושינוי צורה בפמור
ב- בת 78 מונשמת כוויות בפנים
ג- בן 45 עם כויות דרגה 3 באזור שוק שמאל
ד- בן 36 כוויה דרגה שניה בטן תחתונה.

שאלה 150

בן 89, סיעודי, צלול, ללא ירידה קוגניטיבית.

סובל מעצירות כרונית ומטופל באופן קבוע ב (LAXADIN) BISACODYL.

פנה בשל כאב בטן מזה 3 ימים. והחמרה בעצירות.

לדבריו ללא פעולת מעיים מזה 4 ימים.

בבדיקתו: הבטן תפוחה, ישנה מלאות ורגישות קלה, בעיקר בבטן ימנית תחתונה.

מצורף CT בטן עם חומר ניגוד IV, שבוצע במלר"ד.

מהו הצעד הבא?


א. CTA דחוף לאאורטה וסעיפיה.

ב. ניתוח קולקטומיה.

ג. אישפוז במחלקה כירורגית לטיפול אנטיביוטי.


ד. RECTAL TUBE, חוקנים, וטיפול עם POLYETHYLENE GLYCOLE.

התחלת ה CT
המשך בשקופית הבאה




Case courtesy of Dr Roberto Schubert, Radiopaedia.org, rID: 16277


המשך בשקופית הבאה




המשך בשקופית הבאה




המשך בשקופית הבאה




המשך בשקופית הבאה



המשך בשקופית הבאה



המשך בשקופית הבאה




המשך בשקופית הבאה




המשך בשקופית הבאה




המשך בשקופית הבאה




המשך בשקופית הבאה




המשך בשקופית הבאה




המשך בשקופית הבאה




המשך בשקופית הבאה




המשך בשקופית הבאה



המשך בשקופית הבאה



המשך בשקופית הבאה




המשך בשקופית הבאה



המשך בשקופית הבאה



המשך בשקופית הבאה



המשך בשקופית הבאה



המשך בשקופית הבאה



המשך בשקופית הבאה




המשך בשקופית הבאה



המשך בשקופית הבאה



המשך בשקופית הבאה




המשך בשקופית הבאה



המשך בשקופית הבאה



המשך בשקופית הבאה



המשך בשקופית הבאה



המשך בשקופית הבאה



המשך בשקופית הבאה



המשך בשקופית הבאה



המשך בשקופית הבאה



המשך בשקופית הבאה



המשך בשקופית הבאה




המשך בשקופית הבאה



המשך בשקופית הבאה



המשך בשקופית הבאה



המשך בשקופית הבאה



המשך בשקופית הבאה



המשך בשקופית הבאה



המשך בשקופית הבאה



המשך בשקופית הבאה



המשך בשקופית הבאה



המשך בשקופית הבאה



המשך בשקופית הבאה





המשך בשקופית הבאה




המשך בשקופית הבאה




המשך בשקופית הבאה




המשך בשקופית הבאה



המשך בשקופית הבאה



המשך בשקופית הבאה



המשך בשקופית הבאה




המשך בשקופית הבאה



המשך בשקופית הבאה



המשך בשקופית הבאה



המשך בשקופית הבאה



המשך בשקופית הבאה



המשך בשקופית הבאה





המשך בשקופית הבאה



המשך בשקופית הבאה



המשך בשקופית הבאה






המשך בשקופית הבאה




המשך בשקופית הבאה



המשך בשקופית הבאה



המשך בשקופית הבאה



המשך בשקופית הבאה



המשך בשקופית הבאה



המשך בשקופית הבאה




המשך בשקופית הבאה



המשך בשקופית הבאה



המשך בשקופית הבאה



המשך בשקופית הבאה



המשך בשקופית הבאה



המשך בשקופית הבאה



המשך בשקופית הבאה



המשך בשקופית הבאה



המשך בשקופית הבאה



המשך בשקופית הבאה



המשך בשקופית הבאה



המשך בשקופית הבאה





המשך בשקופית הבאה



המשך בשקופית הבאה



המשך בשקופית הבאה



המשך בשקופית הבאה



סיום ה CT



שאלה 150

בן 84, סיעודי, צלול, ללא ירידה קוגניטיבית.

סובל מעצירות כרונית ומטופל באופן קבוע ב BISACODYL (LAXADIN).

פנה בשל כאב בטן מזה 3 ימים. והחמרה בעצירות. לדבריו ללא פעולת מעיים מזה 4 ימים.

בבדיקתו: הבטן תפוחה, ישנה מלאות ורגישות קלה, בעיקר בבטן ימנית תחתונה.

מצורף CT בטן עם חומר ניגוד IV, שבוצע במלר"ד.

מהו הצעד הבא?

א. CT בפרוטוקול אנגיו' לאאורטה וסעיפיה.

ב. ניתוח קולקטומיה.

ג. טיפול אנטיביוטי.

ד. חוקנים דרך RECTAL TUBE.